



Акушерство и гинекология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 02:28 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 02:28 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СПОСОБА ИНФИЦИРОВАНИЯ БРЮШИНЫ РАЗЛИЧАЮТ ПЕРИТОНИТ

1. стертый и классический
2. распространенный и разлитой
3. отграниченный и диффузный
4. первичный и вторичный

Правильный ответ: 4 — первичный и вторичный

Вопрос 2

К ПРОТИВПОКАЗАНИЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЦЕЛЬНОЙ БИОПСИИ ШЕЙКИ МАТКИ ОТНОСЯТ НАЛИЧИЕ

1. аномальных цитологических результатов мазков
2. расхождения результатов цитологического метода исследования и расширенной кольпоскопии
3. выраженных изменений при расширенной кольпоскопии
4. вагинита, цервицита, инфекций, передаваемых половым путём (ИППП)

Правильный ответ: 4 — вагинита, цервицита, инфекций, передаваемых половым путём (ИППП)

Вопрос 3

ПЕРЕХОД С ИНЪЕКЦИОННОГО ПРЕПАРАТА НА КОК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

1. после 7-дневного перерыва
2. после окончания менструальноподобной реакции
3. в день очередной инъекции
4. в первый день менструальноподобной реакции

Правильный ответ: 3 — в день очередной инъекции

Вопрос 4

НАИМЕНЬШЕЙ СПЕЦИФИЧНОСТЬЮ ДЛЯ ВОЗРАСТНЫХ ГОРМОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ОБЛАДАЮТ

1. ознобы
2. эпизоды ночной потливости
3. приливы жара
4. приступы тахикардии

Правильный ответ: 4 — приступы тахикардии

Вопрос 5

У СРЕДНЕСТАТИСТИЧЕСКОЙ ДЕВОЧКИ В РОССИИ _____ (ПЕРВАЯ МЕНСТРУАЦИЯ) ПРИХОДИТ В 12-13 ЛЕТ

1. пубертат
2. спермархе
3. адренархе

4 менархе

Правильный ответ: 4 — менархе

Вопрос 6

ДЛЯ НАРУШЕННОЙ ТРУБНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ ПО ТИПУ ТРУБНОГО АБОРТА ХАРАКТЕРНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ

1. периодически повторяющаяся боль внизу живота
2. быстрое развитие геморрагического шока II-III степени
3. невозможность выполнения органосохраняющей операции на маточной трубе
4. острый приступ боли с кратковременной потерей сознания

Правильный ответ: 1 — периодически повторяющаяся боль внизу живота

Вопрос 7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БАЗАЛЬНОЙ ЛИНИИ ЗАТРУДНЕНО ПРИ СОСТОЯНИИ ПЛОДА

1. активное бодрствование
2. глубокий сон
3. период покоя
4. активный сон

Правильный ответ: 1 — активное бодрствование

Вопрос 8

ОПТИМАЛЬНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ ПРОЛАПСА ГЕНИТАЛИЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1. физиотерапия
2. оперативное вмешательство
3. антибактериальная терапия
4. гормональная терапия

Правильный ответ: 2 — оперативное вмешательство

Вопрос 9

КЛЕТКИ КРОВИ ЯВЛЯЮТСЯ ПРОИЗВОДНЫМ

1. энтодермы
2. эктодермы
3. трофэктодермы
4. мезодермы

Правильный ответ: 4 — мезодермы

Вопрос 10

ВДКН, ОБУСЛОВЛЕННАЯ ДЕФИЦИТОМ 21-ГИДРОКСИЛАЗЫ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ _____
ОБУСЛОВЛЕНА ПЕРЕНОСОМ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ДЕФЕКТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В НЕАКТИВНОМ
ПСЕВДОГЕНЕ CYP21A1P В УЧАСТКИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО CYP21A2

1. отсутствием фенотип-генотипической корреляции и часто
- ② наличием фенотип-генотипической корреляции и часто
3. отсутствием фенотип-генотипической корреляции и редко
4. наличием фенотип-генотипической корреляции и редко

Правильный ответ: 2 — наличием фенотип-генотипической корреляции и часто