



Анестезиология-реаниматология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 02:38 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 02:33 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

К КЛИНИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ ДЕКОМПЕНСИРОВАННОЙ СТАДИИ НАРУШЕНИЙ ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО КРОВотоКА ПРИ ТОКСИКОЗЕ ОТНОСЯТ

1. бледность кожи, положительный симптом «белого пятна»
2. гиперемия кожных покровов, отрицательный симптом «белого пятна»
3. нормальную окраску кожи, отрицательный симптом «белого пятна»
4. мраморный рисунок кожи, двухфазный симптом «белого пятна»

Правильный ответ: 4 — мраморный рисунок кожи, двухфазный симптом «белого пятна»

Вопрос 2

ЕМКОСТЬ СО СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ В РОССИИ ИМЕЕТ ИНДИВИДУАЛЬНУЮ МАРКИРОВКУ _____ ЦВЕТА

1. белого
2. голубого
3. серого
4. черного

Правильный ответ: 4 — черного

Вопрос 3

ОДНИМ ИЗ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА СИСТЕМНОГО ВОСПАЛИТЕЛЬНОГО ОТВЕТА ЯВЛЯЕТСЯ КОЛИЧЕСТВО ЛЕЙКОЦИТОВ В КРОВИ ____ $\times 10^9/\text{л}$

1. $11 \times 10^9/\text{л}$ или менее 3
2. $13 \times 10^9/\text{л}$ или менее 5
3. $12 \times 10^9/\text{л}$ или менее 4
4. 10

Правильный ответ: 3 — $12 \times 10^9/\text{л}$ или менее 4

Вопрос 4

ПОКАЗАНИЕМ ДЛЯ ВВЕДЕНИЯ БИКАРБОНАТА НАТРИЯ ПРИ ДИАБЕТИЧЕСКОМ КЕТОАЦИДОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1. глюкоза плазмы > 15 ммоль/л, pH крови $\leq 7,3$
2. глюкоза плазмы > 15 ммоль/л, резкое повышение кетоновых тел сыворотки крови
3. pH крови $\leq 6,9$ или уровень стандартного бикарбоната < 5 ммоль/л
4. pH крови $\leq 7,3$ или уровень стандартного бикарбоната < 10 ммоль/л

Правильный ответ: 3 — pH крови $\leq 6,9$ или уровень стандартного бикарбоната < 5 ммоль/л

Вопрос 5

БЕНЗОДИАЗЕПИНЫ НЕ ВЫЗЫВАЮТ

1. аналгезию

2. анксиолизис
3. амнезию
4. противосудорожный эффект

Правильный ответ: 1 — аналгезию

Вопрос 6

для ПРОФИЛАКТИКИ ПОСТПУНКЦИОННОЙ ГОЛОВНОЙ БОЛИ РЕКОМЕНДОВАНО ____ ВВЕДЕНИЕ

1. внутримышечное; диклофенака
2. внутривенное; метамизол натрия
3. эпидуральное; кофеина
4. внутривенное; аминофиллина 1 мг\кг

Правильный ответ: 4 — внутривенное; аминофиллина 1 мг\кг

Вопрос 7

ИНДУКЦИОННАЯ ДОЗА ЭТОМИДАТА НАТРИЯ СОСТАВЛЯЕТ ____ МГ/КГ МАССЫ ТЕЛА

1. 0.2 - 0.5
2. 1 - 2.5
3. 1 - 1.5
4. 3 - 5

Правильный ответ: 1 — 0.2 - 0.5

Вопрос 8

МЕТАБОЛИЗМ В НАЧАЛЬНОЙ СТАДИИ РАЗВИТИЯ КРИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ИЗМЕНЯЕТСЯ В ВИДЕ

1. гиперметаболизма
2. нормометаболизма
3. гипометаболизма
4. катаболизма

Правильный ответ: 1 — гиперметаболизма

Вопрос 9

К ИЗМЕНЕНИЯМ, УКАЗЫВАЮЩИМ НА ВЫСОКУЮ СЕКРЕЦИЮ АДГ, ОТНОСЯТ

1. высокую осмолярность мочи
2. протеинурию
3. гипернатриемию
4. низкую концентрацию кортизола плазмы

Правильный ответ: 1 — высокую осмолярность мочи

Вопрос 10

ИЗ АНТИАГРЕГАНТОВ БЛОКАТОРАМИ АДФ-РЕЦЕПТОРОВ ЯВЛЯЮТСЯ

1. необратимые - тиенопиридины (тиклопидин, клопидогрель), прасугрель, обратимые - циклопентил, триазолопиримидин
2. дипиридабол, трифлузал
3. неселективные ингибиторы ЦОГ - АСК, ибупрофен, трифлузал, блокаторы тромбоксана А₂- пикотамид, ридогрел
4. абциксимаб, эптифибатид, тирофибан, ламифибан, фрамон

Правильный ответ: 1 — необратимые - тиенопиридины (тиклопидин, клопидогрель), прасугрель, обратимые - циклопентил, триазолопиримидин