



Детская урология-андрология

Высшее образование

DOCX · PDF

Задач: 1

Вопросов: 12

Сформировано: 26.09.2026, 02:57 МСК · База обновлена: 05.09.2026, 02:51 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Ситуационная задача 0001

Образование: Высшее образование | Специальность: Детская урология-андрология

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Вы - врач детский уролог-андролог стационара. В приемное отделение самотеком обратился отец с девочкой 5 лет.

1.2. Жалобы

На повышение температуры до 39,5°C, вялость, отсутствие аппетита, тошноту, слабость, боли в поясничной области.

1.3. Анамнез заболевания

Вчера появились жалобы на озноб, слабость, боли в спине, отмечалось повышение температуры до 39,5°C, на фоне приема жаропонижающего препарата температура снижается до 38°C на непродолжительное время. Со вчерашнего вечера не пила, не ела из-за выраженной тошноты, при приеме жидкости – рвота.

Отец девочки сообщил, что подобные эпизоды были и ранее, за последние 2 года девочка с аналогичными жалобами была уже 4 раза госпитализирована (лежала с мамой, подробностей и документов предоставить не может).

1.4. Анамнез жизни

- * Девочка от второй беременности, протекавшей без особенностей, срочных родов.
- * Вакцинирована в соответствии с календарем профилактических прививок.
- * Аллергологический анамнез неотягощен. Наследственный анамнез: без особенностей.

1.5. Объективный статус

Состояние ребёнка тяжелое, признаки эксикоза, интоксикации. Температура тела 39,2°C. Слизистые оболочки дужек, небных миндалин, задней стенки глотки не гиперемированы. В легких дыхание проводится во все отделы, хрипов нет.

Тахикардия, тоны сердца приглушены, ритмичные. Живот не вздут, мягкий, доступен глубокой пальпации во всех отделах, умеренно болезненный по фланкам, печень не увеличена, селезенка не пальпируется.

При поколачивании в поясничной области – болезненность. Мочится безболезненно, моча, со слов отца, мутная. Стул был вчера обычной консистенции, со вчерашнего вечера не мочилась.

1. План обследования

Вопрос 1.

Рекомендованными ребенку с диагностической целью лабораторными исследованиями являются

1. общий анализ мочи
2. общий анализ крови
3. посев крови на стерильность
4. анализ мочи по Зимницкому
5. посев мочи на грибы

Правильные ответы:

- 1 - общий анализ мочи
- 2 - общий анализ крови

В качестве диагностического метода рекомендуется проведение общего (клинического) анализа мочи с определением удельного веса мочи, подсчетом количества лейкоцитов, эритроцитов, а также определением белка и нитритов (исследование уровня нитритов в моче), в т.ч. с применением тест-полосок.

Клинические рекомендации Минздрава России. Инфекция мочевых путей, 2024 г.

(1)

Рекомендовано проведение общего (клинического) анализа крови развернутого у пациентов с лихорадкой и подозрением на ИМП для оценки воспалительной реакции.

Клинические рекомендации Минздрава России. Инфекция мочевых путей, 2024 г.

(1)

Вопрос 2.

Необходимым для подтверждения диагноза неинвазивным инструментальным методом обследования является

1. ультразвуковое исследование органов брюшной полости
2. ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря
3. обзорная рентгенография органов брюшной полости
4. рентгенография органов грудной клетки

Правильный ответ:

2 - ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря

Рекомендуется проводить ультразвуковое исследование (УЗИ) почек, УЗИ мочевого пузыря, УЗИ мочевыводящих путей всем детям во время (при возможности, в первые 24 часа после обращения) и после первого эпизода (через 1-2 недели) ИМП.

Клинические рекомендации Минздрава России. Инфекция мочевых путей, 2024 г.

(1)

Вопрос 3.

Этиологию заболевания у данного пациента может подтвердить

1. определение уровня С-реактивного белка
2. коагулограмма
3. бактериологическое исследование мочи
4. биохимический анализ крови

Правильный ответ:

3 - бактериологическое исследование мочи

Рекомендовано детям с подозрением на ИМП бактериологическое исследование мочи (микробиологическое (культуральное) исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы) с определением чувствительности микроорганизмов к антимикробным химиотерапевтическим препаратам до начала АБТ с целью подтверждения диагноза и определения этиологического возбудителя.

При подтверждении лейкоцитурии у ребенка с лихорадкой, необходимости в определении СРБ и ПКТ для подтверждения ИМП нет.

Клинические рекомендации Минздрава России. Инфекция мочевых путей, 2024 г.

(1)

(2)

2. Диагноз

Вопрос 4.

Ребенку можно установить диагноз

1. Инфекция нижних мочевыводящих путей, рецидивирующее течение, стадия обострения
2. Острый геморрагический цистит, фаза стихания обострения
3. Острое респираторно-вирусное заболевание
4. Острый пиелонефрит, активная стадия

Правильный ответ:

4 - Острый пиелонефрит, активная стадия

После второго года жизни симптомы и признаки ИМП становятся более специфичными. Проявления пиелонефрита включают лихорадку (реже субфебрильное повышение температуры тела) без катаральных явлений, озноб, рвоту, недомогание, боль в боку, боль в спине и болезненность реберно-позвоночного угла.

Клинические рекомендации Минздрава России. Инфекция мочевых путей, 2024 г.

(1)

Лейкоцитурией считается обнаружение лейкоцитов более 10 в поле зрения или более 25 в 1 мкл мочи в образце мочи, полученной при спонтанном мочеиспускании.

(2)

Данные общего (клинического) анализа крови: лейкоцитоз выше $15 \times 10^9/\text{л}$; высокие уровни С-реактивного белка (СРБ) (≥ 30 мг/л) указывают на высокую вероятность бактериальной инфекции.

(3)

3. Лечение

Вопрос 5.

Учитывая сохраняющиеся жалобы и нарастающую тяжесть состояния, тактика участкового врача заключается в

1. госпитализации в круглосуточный стационар
2. наблюдении в условиях интенсивной палаты приемного отделения
3. ведении пациента амбулаторно
4. госпитализации в дневной стационар

Правильный ответ:

1 - госпитализации в круглосуточный стационар

Показания для госпитализации:

1. Дети до 6 месяцев жизни с фебрильной лихорадкой
2. Дети с острым пиелонефритом с симптомами интоксикации и рвоты;
3. Отсутствие возможности осуществить оральную регидратацию при наличии признаков обезвоживания;
4. Бактериемия и сепсис;
5. Острая задержка мочи

Клинические рекомендации Минздрава России. Инфекция мочевых путей, 2024 г.

(1)

Вопрос 6.

Учитывая анамнез и результаты обследования, причиной ИМВП может быть наличие пузырно-мочеточникового рефлюкса. Методом, считающимся стандартом для выявления данного состояния, является

1. цистоскопия
2. цистография
3. урофлоуметрия
4. экскреторная урография

Правильный ответ:
2 - цистография

Рекомендуется проведение цистографии после первого эпизода фебрильной ИМП при наличии признаков нарушения уродинамики по данным УЗИ почек и мочевого пузыря с целью диагностики ПМР и определения его степени, а также выявления уретероцеле, дивертикула, клапана задней уретры и др.

Цистография также может проводиться при рецидивирующем течении ИМП.

Клинические рекомендации Минздрава России. Инфекция мочевых путей, 2024 г.

- (1)
(2)

Вопрос 7.

Данному ребенку цистографию следует провести

1. в экстренном порядке
2. в срочном порядке
3. в случае неэффективности терапии
4. после купирования воспалительного процесса

Правильный ответ:
4 - после купирования воспалительного процесса

Цистография не проводится в активную стадию/при обострении.

Клинические рекомендации Минздрава России. Инфекция мочевых путей, 2024 г.

- (1)

Вопрос 8.

Учитывая наличие интоксикации, а также рвоты при попытке дать воду ребенку, целесообразным путем введения антибактериального препарата является

1. исключительно пероральный
2. парентеральный в первые 24-72 часа
3. парентеральный на весь курс
4. пероральный с переводом на парентеральный при неэффективности

Правильный ответ:
2 - парентеральный в первые 24-72 часа

У госпитализированных пациентов, особенно грудного возраста, которым трудно принимать и усваивать препарат внутрь, обычно АБТ рекомендуется начинать с парентерального (в первую очередь, внутривенного) пути введения ПМП в первые 24- 72 часа (табл. 2) с последующим

переходом на пероральный прием. При отсутствии выраженной интоксикации и сохранной способности ребенка получать препарат внутрь рекомендовано назначение перорального приема ПМП с первых суток.

Клинические рекомендации Минздрава России. Инфекция мочевых путей, 2024 г.

(1)

Вопрос 9.

Антибактериальным препаратом выбора у данного пациента, учитывая выраженную интоксикацию и повторную рвоту, является

1. амоксиклав перорально
2. цефтриаксон
3. амоксиклав парентерально
4. цефиксим

Правильный ответ:

2 - цефтриаксон

Учитывая повторную рвоту и симптомы интоксикации, целесообразно начать антибактериальную терапию с парентерального введения препарата. Препараты выбора:

- * Цефтриаксон
- * Цефотаксим (с 0 мес)
- * Цефтазидим (с 0 мес)
- * Цефепим (с 2 мес)

Клинические рекомендации Минздрава России. Инфекция мочевых путей, 2024 г.

(1)

(2)

Вопрос 10.

Рекомендованная длительность антибактериальной терапии в данном случае не менее _____ дней

1. 14
2. 5
3. 7
4. 10

Правильный ответ:

4 - 10

При остром пиелонефрите рекомендована длительность антибактериальной терапии в среднем, не менее 10 дней. Более длительные курсы не имеют преимуществ в плане предотвращения рецидивов.

Клинические рекомендации Минздрава России. Инфекция мочевых путей, 2024 г.

(1)

4. Вариатив

Вопрос 11.

Динамическое наблюдение после выписки из стационара показано ребенку в течение

1. 1-го года
2. 6 месяцев
- 3** 3-х лет
4. 2-х лет

Правильный ответ:
3 - 3-х лет

Динамическое наблюдение за пациентами, перенесшими острый пиелонефрит должно проводиться не менее 3 лет.

Клинические рекомендации Минздрава России. Инфекция мочевых путей, 2024 г.

(1)

Вопрос 12.

Амбулаторное наблюдение за пациентом в данном случае проводит

1. клинический фармаколог
2. хирург
- 3** нефролог
4. уролог-андролог

Правильный ответ:
3 - нефролог

Пациента ведет врач-нефролог или врач-педиатр или врач общей практики (семейный врач), при необходимости осуществляются консультации и обследования с участием врача- детского уролога-андролога, врача-акушера-гинеколога, врача-генетика, врача-клинического фармаколога, врача-детского хирурга и других.

Клинические рекомендации Минздрава России. Инфекция мочевых путей, 2024 г.

(1)