



Эпидемиология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 07:59 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 07:05 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ВОЗБУДИТЕЛИ ЭНДЕМИЧЕСКОГО СЫПНОГО ТИФА СОХРАНЯЮТСЯ В МЕЖЭПИДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

1. в грызунах и их блохах
2. в клещах, паразитирующих на птицах
3. у людей, ранее переболевших эндемическим сыпным тифом
4. у лиц, имеющих контакт с грызунами (работники пищевых предприятий, кладовщики, продавцы и др.)

Правильный ответ: 1 — в грызунах и их блохах

Вопрос 2

ВОЗБУДИТЕЛЯМИ АСТРАХАНСКОЙ ПЯТНИСТОЙ ЛИХОРАДКИ ЯВЛЯЮТСЯ

1. *Rickettsia conorii caspia*
2. *Rickettsia sibirica*
3. *Rickettsia rickettsii*
4. *Rickettsia australis*

Правильный ответ: 1 — *Rickettsia conorii caspia*

Вопрос 3

К КРИТЕРИЯМ ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ ПРИ РЕСПИРАТОРНОЙ MYCOPLASMA PNEUMONIAE-ИНФЕКЦИИ ОТНОСЯТ

1. полное отсутствие клинических симптомов инфекции
2. рентгенологическое выздоровление, санацию от возбудителя
3. снижение титров антител класса IgG и IgM
4. выделение микоплазм только в низком титре

Правильный ответ: 2 — рентгенологическое выздоровление, санацию от возбудителя

Вопрос 4

ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ПОТЕНЦИАЛЬНОМ ОЧАГЕ МАЛЯРИИ В СЕЗОН ПЕРЕДАЧИ ЗАКЛЮЧАЮТСЯ В

1. лечении лихорадящих лиц
2. вакцинации взрослого населения
3. диспансеризации населения
4. медикаментозной профилактике населения

Правильный ответ: 1 — лечении лихорадящих лиц

Вопрос 5

ДО ПОЛОВОЗРЕЛОГО СОСТОЯНИЯ РАЗВИТИЕ АСКАРИДЫ В ОРГАНИЗМЕ ЧЕЛОВЕКА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

1. 6 месяцев

- 2. 2-3 дня
- 3. 2,5-3 недели
- 4. 2,5-3 месяца

Правильный ответ: 4 — 2,5-3 месяца

Вопрос 6

ИММУНИТЕТ ПОСЛЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ БРУЦЕЛЛЕЗОМ В ЕСТЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЯХ

- 1. кратковременный
- 2. отсутствует
- 3. длительный
- 4. пожизненный

Правильный ответ: 1 — кратковременный

Вопрос 7

СОТРУДНИКИ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА ЭНТЕРОВИРУСЫ, ДОЛЖНЫ

- 1. проходить еженедельный медицинский осмотр
- 2. проходить ежедневную термометрию
- 3. быть иммунизированы против полиомиелита
- 4. ежеквартально проходить контрольные исследования на наличие соответствующих антигенов (антител) в сыворотке крови

Правильный ответ: 3 — быть иммунизированы против полиомиелита

Вопрос 8

ОРНИТОЗ ОТНОСИТСЯ К ИНФЕКЦИЯМ ГРУППЫ

- 1. зоонозов
- 2. зооантропонозов
- 3. сапронозов
- 4. антропонозов

Правильный ответ: 1 — зоонозов

Вопрос 9

БОЛЕЗНЬ БРИЛЛЯ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. острой формой сыпного тифа
- 2. атипично протекающей формой сыпного тифа
- 3. хронической формой сыпного тифа
- 4. рецидивом сыпного тифа

Правильный ответ: 4 — рецидивом сыпного тифа

Вопрос 10

НЕОБХОДИМОСТЬ ЕЖЕГОДНОЙ ИММУНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОТИВ ГРИППА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ

1. изменчивостью циркулирующих штаммов вируса гриппа и продолжительностью формирующегося иммунитета в 6 месяцев
2. недостаточным охватом населения профилактическими прививками и ежегодными эпидемиями гриппа
3. несвоевременной иммунизацией и высокой заболеваемостью гриппом
4. недостаточной привитостью населения и низкой иммуногенностью вакцин

Правильный ответ: 1 — изменчивостью циркулирующих штаммов вируса гриппа и продолжительностью формирующегося иммунитета в 6 месяцев