**MedikCase**

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

# Функциональная диагностика

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 04:11 МСК

## ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

### 1 Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

### 2 Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

### 3 Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

### 4 Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

## Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

## Вопрос 1

КОРНЕЛЬСКИЙ ВОЛЬТАЖНЫЙ ИНДЕКС (RAVL + SV3) СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ О ГИПЕРТРОФИИ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА У МУЖЧИН ПРИ ЗНАЧЕНИИ БОЛЬШЕ (В ММ)

1. 25
2. **28**
3. 18
4. 20

**Правильный ответ: 2 - 28**

## Вопрос 2

ИМПЛАНТИРУЕМЫЕ ПРИБОРЫ ДЛЯ ДЛИТЕЛЬНОЙ ЭКГ РЕГИСТРАЦИИ (ПЕТЛЕВЫЕ РЕГИСТРАТОРЫ) СПОСОБНЫ ПРОВОДИТЬ ЗАПИСЬ РИТМА СЕРДЦА ДО

1. 3 месяцев
2. **12 месяцев**
3. 30 дней
4. 7 дней

**Правильный ответ: 2 - 12 месяцев**

## Вопрос 3

РЕТИКУЛЯРНЫЕ ВАРИКОЗНЫЕ ВЕНЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ СОБОЙ РАСШИРЕННЫЕ ИЗВИТЫЕ ПОДКОЖНЫЕ ВЕНЫ ДИАМЕТРОМ (В МИЛЛИМЕТРАХ)

1. менее 1
2. 3,5-5
3. **1-3**
4. более 5

**Правильный ответ: 3 - 1-3**

## Вопрос 4

ДОСТОВЕРНЫМ КРИТЕРИЕМ ИШЕМИИ МИОКАРДА ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ВЕЛОЭРГОМЕТРИЧЕСКОЙ ПРОБЫ СЧИТАЕТСЯ

1. инверсия зубца Т на 2 ступени нагрузочной пробы
2. **депрессия сегмента ST на 2 мм и более**
3. элевация на электрокардиограмме сегмента ST на 0,5 мм
4. снижение точки «j» более, чем на 2 мм на электрокардиограмме

**Правильный ответ: 2 - депрессия сегмента ST на 2 мм и более**

## Вопрос 5

ИНФОРМАЦИЮ, СОСТАВЛЯЮЩУЮ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ, БЕЗ СОГЛАСИЯ ГРАЖДАНИНА ПРЕДОСТАВЛЯЮТ ПО ЗАПРОСУ

1. **военных комиссариатов в целях проведения военно-врачебной экспертизы**
2. образовательных организаций в целях использования в учебном процессе
3. адвокатских коллегий в целях защиты прав пациента
4. научных организаций в целях проведения научных исследований и опубликования их результатов

**Правильный ответ: 1 - военных комиссариатов в целях проведения военно-врачебной экспертизы**

## Вопрос 6

ОТНОШЕНИЕ ШИРИНЫ АОРТАЛЬНОЙ РЕГУРГИТАЦИИ ТЯЖЕЛОЙ СТЕПЕНИ, ≥ III СТЕПЕНИ, К ДИАМЕТРУ ВЫВОДНОГО ТРАКТА ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА СОСТАВЛЯЕТ (В ПРОЦЕНТАХ)

1. **более 65**
2. 25-35
3. менее 25
4. 36-64

**Правильный ответ: 1 - более 65**

## Вопрос 7

ЭЛЕКТРОКАРДИОГРАММА ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ЗАПИСЬ

1. функциональных шумов сердца
2. **электрических потенциалов сердца**
3. ультразвуковых волн
4. тонов сердца

**Правильный ответ: 2 - электрических потенциалов сердца**

## Вопрос 8

К ХАРАКТЕРНЫМ ЭКГ-ПРИЗНАКАМ ГИПЕРТРОФИИ МИОКАРДА ОТНОСЯТ

1. глубокие зубцы Q
2. горизонтальную депрессию S-T
3. зубцы QS
4. **депрессию S-T выпуклостью кверху и несимметричный зубец Т**

**Правильный ответ: 4 - депрессию S-T выпуклостью кверху и несимметричный зубец Т**

## Вопрос 9

ДЛЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПАРОКСИЗМАЛЬНОЙ РЕЦИПРОКНОЙ АТРИО-ВЕНТРИКУЛЯРНОЙ УЗЛОВОЙ ТАХИКАРДИИ НЕОБХОДИМО

1. аберратное проведение на желудочки
2. повышение автоматизма клеток проводящей системы сердца – эктопических центров II и III порядка
3. **наличие условий для циркуляции импульса в АВ-узле**
4. повышение автоматической активности АВ-соединения

**Правильный ответ: 3 - наличие условий для циркуляции импульса в АВ-узле**

## Вопрос 10

ПРИЧИНОЙ РАЗВИТИЯ СИНДРОМА ВЕРХНЕЙ ПОЛОЙ ВЕНЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1. **опухоль верхушки легкого**
2. варикозное расширение медиальной подкожной вены
3. острый тромбоз подмышечной вены
4. острый тромбоз подключичной вены

**Правильный ответ: 1 - опухоль верхушки легкого**