



Гематология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 02:41 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 02:41 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ДИАГНОСТИЧЕСКИМ МЕРОПРИЯТИЕМ, РЕКОМЕНДУЕМЫМ ПРИ ДИФфуЗНОЙ В-КРУПНОКЛЕТОЧНОЙ ЛИМФОМЕ У ДЕТЕЙ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. тонкоигольная пункционная биопсия л/у
2. сцинтиграфия костей скелета
3. трепанобиопсия
4. биопсия лимфоузла (очага поражения) с иммуногистохимическим исследованием

Правильный ответ: 4 — биопсия лимфоузла (очага поражения) с иммуногистохимическим исследованием

Вопрос 2

ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ

1. количество тромбоцитов
2. фибриноген
3. бета-тромбоглобулин
4. тромбиновое время

Правильный ответ: 1 — количество тромбоцитов

Вопрос 3

ПРИМЕРОМ СНИЖЕННОЙ ЭКСПРЕССИИ АНТИГЕНОВ ОПУХОЛЕВЫМИ КЛЕТКАМИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. экспрессия мембранного маркера только внутриклеточно
2. отсутствие более раннего из двух одновременно экспрессируемых антигенов при появлении более позднего
3. повышенная экспрессия маркеров клеток-предшественников
4. отсутствие на гепопоэтических клетках общелейкоцитарного антигена CD45

Правильный ответ: 4 — отсутствие на гепопоэтических клетках общелейкоцитарного антигена CD45

Вопрос 4

НАСЛЕДСТВЕННЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ, НЕ СВЯЗАННЫМ С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ ОНКОГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СЧИТАЮТ

1. муковисцидоз
2. синдром Дауна
3. синдром Луи-Бар (Атаксия телеангиоэктазия)
4. анемию Фанкони

Правильный ответ: 1 — муковисцидоз

Вопрос 5

К ИНФЕКЦИЯМ, ПЕРЕДАЮЩИМСЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫМ ПУТЁМ, ОТНОСЯТ

1. вирус эритроblastоза человека
2. вирус парагриппа, метапневмовирус

3. парвовирус В19

☒ 4 Т-лимфотропный вирус человека, вирус лихорадки Западного Нила

Правильный ответ: 4 — Т-лимфотропный вирус человека, вирус лихорадки Западного Нила

Вопрос 6

ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ ВЫЗЫВАЕТ ПЕРВООЧЕРЕДНУЮ НЕОБХОДИМОСТЬ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В СВЯЗИ С НАИБОЛЬШЕЙ УГРОЗОЙ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЮ, ЛИБО СТАНОВИТСЯ ПРИЧИНОЙ СМЕРТИ, ЯВЛЯЕТСЯ _____ ЗАБОЛЕВАНИЕМ

1. рецидивирующим

☒ 2 основным

3. прогрессирующим

4. сопутствующим

Правильный ответ: 2 — основным

Вопрос 7

НК-КЛЕТКИ НЕ ЭКСПРЕССИРУЮТ

☒ 1 CD19

2. CD56

3. CD7

4. CD45

Правильный ответ: 1 — CD19

Вопрос 8

ПОД ТРОМБОЦИТОПАТИЯМИ ПОНИМАЮТ ГРУППУ НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХСЯ

1. антигенной несовместимостью тромбоцитов плода и матери

2. тромбозом тромбоцитов, нагруженных гаптенами лекарственного происхождения

3. наличием гигантской гемангиомы в сочетании с тромбоцитопенией и гемолитической анемией

☒ 4 нарушением агрегационной функции тромбоцитов

Правильный ответ: 4 — нарушением агрегационной функции тромбоцитов

Вопрос 9

ПРИ ЛЕЧЕНИИ ОЛЛ ИНТРАТЕКАЛЬНАЯ ТЕРАПИЯ

1. используется только у детей до 3 лет

2. применяется только в рецидиве

3. применяется только при инициальном нейрорлейкозе

☒ 4 является обязательной

Правильный ответ: 4 — является обязательной

Вопрос 10

ПРИ МНОЖЕСТВЕННОЙ МИЕЛОМЕ ДЛЯ МОНИТОРИНГА МИНИМАЛЬНОЙ ОСТАТОЧНОЙ БОЛЕЗНИ
ПРОТОЧНАЯ ЦИТОМЕТРИЯ

- 1. является одним из наиболее применимых методов
- 2. применяется только при невозможности использования количественной ПЦР
- 3. применяется только в отсутствии терапии даратумомабом
- 4. не используется

Правильный ответ: 1 — является одним из наиболее применимых методов