



## Инфекционные болезни

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 03:27 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 03:22 МСК

### ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

#### Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

#### Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

#### Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

#### Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

### Сайт, обновления и поддержка

- [medikcase.ru](https://medikcase.ru)
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- [support@medikcase.ru](mailto:support@medikcase.ru)



Сайт



Telegram

## Вопрос 1

К ОСНОВНЫМ МЕТОДАМ ЛАБОРАТОРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИ ХОЛЕРЕ ОТНОСИТСЯ

1. биологический
2. бактериологический
3. кожно-аллергическая проба
4. серологический

**Правильный ответ: 2 — бактериологический**

## Вопрос 2

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ТУЛЯРЕМИИ У ВЗРОСЛЫХ ПРИМЕНЯЮТ

1. азитромицин
2. пенициллин
3. ампициллин
4. тетрациклин

**Правильный ответ: 4 — тетрациклин**

## Вопрос 3

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ ОСОБЕННОСТЬЮ ПНЕВМОНИИ ПРИ ОРНИТОЗЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1. пневмония с выпотным плевритом
2. односторонняя интерстициальная пневмония
3. абсцедирующая пневмония
4. очаговая пневмония в верхней доле

**Правильный ответ: 2 — односторонняя интерстициальная пневмония**

## Вопрос 4

БОЛЬНОЙ ВИРУСНЫМ ГЕПАТИТОМ А ЯВЛЯЕТСЯ ИСТОЧНИКОМ ЗАРАЖЕНИЯ В ОСНОВНОМ

1. с появлением желтухи
2. в периоде ранней реконвалесценции
3. в конце желтушного периода
4. в преджелтушный период

**Правильный ответ: 4 — в преджелтушный период**

## Вопрос 5

ПЕРЕНОСЧИКАМИ ИНФЕКЦИИ ПРИ ЛИХОРАДКЕ ДЕНГЕ ЯВЛЯЮТСЯ

1. птицы
2. клещи
3. слепни
4. комары

**Правильный ответ: 4 — комары**

## Вопрос 6

МЕХАНИЗМОМ ЗАРАЖЕНИЯ БРЮШНЫМ ТИФОМ ЯВЛЯЕТСЯ

1. трансмиссивный
2. аспирационный
3. фекально-оральный
4. контактно-бытовой

**Правильный ответ: 3 — фекально-оральный**

## Вопрос 7

ПАЦИЕНТУ, С КОЛИЧЕСТВОМ CD4 МЕНЕЕ 350 КЛ/МЛ, В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ НАЗНАЧАЕТСЯ

1. профилактика пневмоцистной пневмонии
2. химиопрофилактика туберкулеза
3. интерферонотерапия
4. витаминотерапия в высоких дозах

**Правильный ответ: 2 — химиопрофилактика туберкулеза**

## Вопрос 8

СЛУЧАЕМ, ПОДОЗРИТЕЛЬНЫМ НА ЛЕПТОСПИРОЗ, ЯВЛЯЕТСЯ

1. любое проявление инфекционного заболевания при указании на контакт с мясом дикого кабана
2. проявление инфекционной симптоматики с наличием в анамнезе контактов с водой открытых водоемов
3. проявление любой инфекционной симптоматики при указании на употребление в пищу устриц
4. остролихорадочное заболевание, связанное с пребыванием в Турции

**Правильный ответ: 2 — проявление инфекционной симптоматики с наличием в анамнезе контактов с водой открытых водоемов**

## Вопрос 9

ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ СПОРОГОНИИ НЕОБХОДИМО, ЧТОБЫ

1. средняя температура окружающей среды была выше 16С
2. было достаточным количество комаров-переносчиков
3. температура воды в водоеме была выше 20С
4. количество паразитов в крови пациента было высоким

**Правильный ответ: 1 — средняя температура окружающей среды была выше 16С**

## Вопрос 10

ПРИ УЛЬТРАЗВУКОВОМ ИССЛЕДОВАНИИ У БОЛЬНЫХ ИЕРСИНИОЗОМ ЧАСТО ОБНАРУЖИВАЮТ

1. диффузные изменения поджелудочной железы
2. мезентериальный лимфаденит
3. жидкость в забрюшинном пространстве

4. увеличение размеров почек и чашечно-лоханочной системы

**Правильный ответ: 2 — мезентериальный лимфаденит**