



Колопроктология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 03:21 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 03:16 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

К НЕОРГАНЫМ ОПУХОЛЯМ ТАЗА ЭМБРИОНАЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ОТНОСЯТСЯ

1. миксомы
2. рабдомиомы
3. хордомы
4. шванномы

Правильный ответ: 3 - хордомы

Вопрос 2

ЖАЛОБЫ НА ЧУВСТВО НЕПОЛНОГО ОПОРОЖНЕНИЯ КИШЕЧНИКА ИЛИ ЛОЖНЫЕ ПОЗЫВЫ НА ДЕФЕКАЦИЮ НАИБОЛЕЕ ХАРАКТЕРНЫ ДЛЯ РАКА

1. слепой кишки
2. нисходящей ободочной кишки
3. поперечной ободочной кишки
4. прямой кишки

Правильный ответ: 4 - прямой кишки

Вопрос 3

ЦИРКУЛЯРНЫЙ РАЗРЕЗ СТЕНКИ ПРЯМОЙ КИШКИ ПРИ БРЮШНО-АНАЛЬНОЙ РЕЗЕКЦИИ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВОДИТЬ НА 1 СМ ДИСТАЛЬНОЕ ОПУХОЛИ С ЦЕЛЬЮ

1. достижения адекватной дистальной границы резекции
2. более удобного доступа для выделения кишки
3. сохранения функции держания анального сфинктера
4. сохранения мышцы, поднимающей задний проход

Правильный ответ: 1 - достижения адекватной дистальной границы резекции

Вопрос 4

КАКОЙ СЛОЙ ЭПИТЕЛИЯ ИНФИЦИРУЕТ ВПЧ?

1. шиповатый
2. зернистый
3. базальный
4. роговой

Правильный ответ: 3 - базальный

Вопрос 5

ПРИ НАЛИЧИИ АНАЛЬНОЙ ТРЕЩИНЫ РЕКТОРОМАНОСКОПИЮ

1. следует отсрочить до купирования болей
2. следует выполнить после дивульсии заднего прохода
3. не следует выполнять
4. следует выполнить обязательно уже при первичном осмотре

Правильный ответ: 1 - следует отсрочить до купирования болей

Вопрос 6

В МЕЖДУНАРОДНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАКА (TNM8) ДЛЯ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА КРИТЕРИЙ N1A ОБОЗНАЧАЕТ НАЛИЧИЕ МЕТАСТАЗОВ В РЕГИОНАРНЫХ ЛИМФОУЗЛАХ В КОЛИЧЕСТВЕ

- ☒ 1
- 2. 3
- 3. 2
- 4. 4

Правильный ответ: 1 - 1

Вопрос 7

ПРИ ЛЕЧЕНИИ АНАЛЬНОЙ ТРЕЩИНЫ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ НИТРОГЛИЦЕРИНОВУЮ МАЗЬ 0,4% В КОЛИЧЕСТВЕ (В МЛ)

- 1. 1
- 2. 0.4
- 3. 0.3
- ☒ 4. 0.5

Правильный ответ: 4 - 0.5

Вопрос 8

НАЛИЧИЕ ПЕРИТОНЕАЛЬНЫХ МЕТАСТАЗОВ ПРИ РАКЕ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ В КЛАССИФИКАЦИИ TNM (8 РЕДАКЦИЯ) СООТВЕТСТВУЕТ КРИТЕРИЮ

- 1. Mx
- ☒ 2. M1c
- 3. M1a
- 4. M1b

Правильный ответ: 2 - M1c

Вопрос 9

ПРОВЕДЕНИЕ КОЛОНОСКОПИИ НОСИТЕЛЮ МУТАЦИЙ В ГЕНЕ MUTYH, ПОКАЗАНО С (В ГОДАХ)

- ☒ 1. 25
- 2. 15
- 3. 45
- 4. 35

Правильный ответ: 1 - 25

Вопрос 10

У ПАЦИЕНТОВ С БОЛЕЗНЬЮ КРОНА ПРИ ФОРМИРОВАНИИ ПРОТЯЖЕННОЙ СТРИКТУРЫ ТЕРМИНАЛЬНОГО ОТДЕЛА ПОДВЗДОШНОЙ КИШКИ ИЛИ ИЛЕОЦЕКАЛЬНОГО КЛАПАНА ОПЕРАЦИЕЙ ВЫБОРА ЯВЛЯЕТСЯ

1. формирование обходного анастомоза
2. эндоскопическое бужирование
3. резекция илеоцекального отдела кишечника
4. стриктуропластика

Правильный ответ: 3 - резекция илеоцекального отдела кишечника