MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Медицинская биофизика

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 05:26 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1 **Материалы предназначены для одного покупателя**

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2 **Источник материалов - ФМЗА**

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3 **Ответы можно проверить самостоятельно**

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4 **Состав материалов может обновляться**

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт | Telegram

Вопрос 1

ВРЕМЯ ВНУТРЕННЕГО ОТКЛОНЕНИЯ В НОРМЕ ДЛЯ ПРАВОГО ЖЕЛУДОЧКА (СЕК)

1. составляет 0,23
2. меньше 0,05
3. составляет 0,02-0,07
4. **не превышает 0,03**

Правильный ответ: 4 - не превышает 0,03

Вопрос 2

СКОРОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ВОЗБУЖДЕНИЯ В ПОСТГАНГЛИОНАРНЫХ СИМПАТИЧЕСКИХ НЕРВНЫХ ВОЛОКНАХ СОСТАВЛЯЕТ (М/С)

1. 15-30
2. 3-15
3. **0,5-2**
4. 30-70

Правильный ответ: 3 - 0,5-2

Вопрос 3

К ОСНОВНЫМ ПРИЗНАКАМ ПАРАСИСТОЛИИ ОТНОСЯТ

1. только разную величину предэктопического интервала
2. равенство длительности межэктопических интервалов или кратность их длительности наименьшему
3. только наличие «сливных» комплексов
4. **равенство длительности межэктопических интервалов или кратность их длительности наименьшему, разную величину предэктопического интервала и наличие «сливных» комплексов**

Правильный ответ: 4 - равенство длительности межэктопических интервалов или кратность их длительности наименьшему, разную величину предэктопического интервала и наличие «сливных» комплексов

Вопрос 4

ВЛИЯНИЕ БЛУЖДАЮЩЕГО НЕРВА НА СЕРДЦЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЧЕРЕЗ МЕДИАТОР

1. **ацетилхолин**
2. норадреналин
3. глицин
4. серотонин

Правильный ответ: 1 - ацетилхолин

Вопрос 5

ХАРАКТЕРНОЙ ЖАЛОБОЙ БОЛЬНОГО МЕГАЛОБЛАСТНОЙ АНЕМИЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ

1. хромота при ходьбе
2. **жжение языка**
3. боль за грудиной
4. близорукость

Правильный ответ: 2 - жжение языка

Вопрос 6

В НОРМЕ ВРЕМЯ ВНУТРЕННЕГО ОТКЛОНЕНИЯ ДЛЯ ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА (СЕК)

1. менее 0,08
2. от 0,03 до 0,07
3. более 0,05
4. **менее 0,05**

Правильный ответ: 4 - менее 0,05

Вопрос 7

ТРЕПЕТАНИЕ ПРЕДСЕРДИЙ НАИБОЛЕЕ СЛОЖНО ДИФФЕРЕНЦИРОВАТЬ С

1. трепетанием желудочков
2. пароксизмальной тахикардией при синдроме WPW
3. **предсердной тахикардией с АВ-блокадой II степени**
4. узловой пароксизмальной тахикардией

Правильный ответ: 3 - предсердной тахикардией с АВ-блокадой II степени

Вопрос 8

НЕЙРОТРАНСМИТТЕРОМ В ТЕРМИНАЛЯХ СИМПАТИЧЕСКИХ ПОСТГАНГЛИОНАРНЫХ НЕЙРОНОВ ЯВЛЯЕТСЯ

1. ацетилхолин
2. **норадреналин**
3. дофамин
4. серотонин

Правильный ответ: 2 - норадреналин

Вопрос 9

ПРИ БРОНХОКОНСТРИКТОРНОМ ТЕСТЕ ЗНАЧИМЫМ СЧИТАЕТСЯ ПАДЕНИЕ ОФВ1 НА _____ %

1. **20**
2. менее 15
3. 20-18
4. 18-15

Правильный ответ: 1 - 20

Вопрос 10

ЧИСЛО ПРЕДСЕРДНЫХ ВОЛН «F» ПРИ ТРЕПЕТАНИИ ПРЕДСЕРДИЙ СОСТАВЛЯЕТ _____ В МИНУТУ

1. менее 200
2. **220-350**
3. более 400
4. 350-400

Правильный ответ: 2 - 220-350