MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Неонатология

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 08:58 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1 Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2 Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3 Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4 Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

ОСНОВНЫМ ОТЛИЧИЕМ ТОКСИЧЕСКОЙ ФОРМЫ ОСТРОГО ГЕМАТОГЕННОГО ОСТЕОМИЕЛИТА И АРТРИТА НОВОРОЖДЕННЫХ ОТ МЕСТНОЙ ЯВЛЯЕТСЯ НАЛИЧИЕ

1. гиперемии, локальной гипертермии и отека мягких тканей сустава
2. псевдопареза пораженной конечности
3. болезненности при пальпации пораженного метафиза
4. **симптомов инфекционного токсикоза**

Правильный ответ: 4 - симптомов инфекционного токсикоза

Вопрос 2

К ОСЛОЖНЕНИЯМ, ВОЗНИКАЮЩИМ В РЕЗУЛЬТАТЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ТЕЧЕНИЯ ЭОЗИНОФИЛЬНОГО ГАСТРОЭНТЕРИТА, ОТНОСЯТ

1. малигнизацию
2. **стеноз привратника**
3. некроз и перфорацию стенки кишки
4. синдром Мендельсона

Правильный ответ: 2 - стеноз привратника

Вопрос 3

НАИБОЛЕЕ ЧАСТЫМ ПЕРВЫМ ПРИЗНАКОМ ДЕФИЦИТА XIII ПЛАЗМЕННОГО ФАКТОРА ЯВЛЯЕТСЯ КРОВОТОЧИВОСТЬ ИЗ

1. носовых ходов
2. кубитальной вены
3. желудка
4. **пупочной ранки**

Правильный ответ: 4 - пупочной ранки

Вопрос 4

ЕСЛИ НА ФОНЕ НЕПРЯМОГО МАССАЖА СЕРДЦА ЧАСТОТА СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ ПОВЫШАЕТСЯ И СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ ___ УДАРОВ В МИНУТУ, СЛЕДУЕТ ПРЕКРАТИТЬ НЕПРЯМОЙ МАССАЖ СЕРДЦА И ПРОДОЛЖИТЬ ИСКУССТВЕННУЮ ВЕНТИЛЯЦИЮ ЛЕГКИХ

1. 90
2. 120
3. 30
4. **60**

Правильный ответ: 4 - 60

Вопрос 5

ЛЕЧЕНИЕ НЕПРЯМОЙ ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИИ У НОВОРОЖДЕННЫХ ВКЛЮЧАЕТ

1. инфузию раствора альбумина
2. инфузию раствора глюкозы 5%
3. **проведение фототерапии**
4. прием урсодезоксихолевой кислоты

Правильный ответ: 3 - проведение фототерапии

Вопрос 6

К ЗАДАЧАМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ СТАДИИ (ПОЛНОГО ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ) В ЛЕЧЕНИИ СИНДРОМА КОРОТКОЙ КИШКИ У НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА ОТНОСЯТ

1. коррекцию дефицита отдельных нутриентов
2. стимуляцию кишечника путем зондового капельного введения гиперосмолярных растворов
3. постепенное введение энтерального питания в небольших объемах
4. **восполнение потерь жидкости и борьбу с диареей**

Правильный ответ: 4 - восполнение потерь жидкости и борьбу с диареей

Вопрос 7

ФАКТОРОМ РИСКА РАЗВИТИЯ НЕКРОТИЗИРУЮЩЕГО ЭНТЕРОКОЛИТА У НОВОРОЖДЕННОГО ЯВЛЯЕТСЯ

1. раннее начало трофического энтерального питания нативным молоком
2. **катетеризация пупочной вены**
3. постановка глубокой венозной линии через периферическую вену
4. назначение пробиотической терапии

Правильный ответ: 2 - катетеризация пупочной вены

Вопрос 8

ОБСЛЕДОВАНИЕ НОВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ (НЕОНАТАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ) НА НАСЛЕДСТВЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ

1. синдром Дауна
2. врожденный гипертиреоз
3. **муковисцидоз**
4. гемофилию

Правильный ответ: 3 - муковисцидоз

Вопрос 9

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЧАСТОТА ПРОВЕДЕНИЯ ЭХОГРАММЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ВСЕХ НЕДОНОШЕННЫХ НОВОРОЖДЕННЫХ С ЭКСТРЕМАЛЬНО И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ

1. на 1-3-й день, повторно на 11-14 день
2. на 5 день, повторно на 7-10 день
3. **на 1-3-й день, повторно на 7-10 день**
4. на 1-й день, повторно на 10-14 день

Правильный ответ: 3 - на 1-3-й день, повторно на 7-10 день

Вопрос 10

ВЫДЕЛЯЮТ _____ СИНДРОМЫ УДЛИНЕННОГО ИНТЕРВАЛА QT

1. **врожденный и приобретенный**
2. ортодромный и антидромный
3. реципрокный и узловой
4. ускоренный и выскальзывающий

Правильный ответ: 1 - врожденный и приобретенный