



Неврология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 03:47 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 03:40 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

К ПСИХОСТИМУЛЯТОРАМ ОТНОСИТСЯ

1. имипрамин
2. азафен
3. сиднокарб
4. пароксетин

Правильный ответ: 3 - сиднокарб

Вопрос 2

ГОРМЕТОНИЕЙ НАЗЫВАЮТ СОСТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ НАБЛЮДАЮТ

1. повышение мышечного тонуса в разгибателях верхних конечностей и сгибателях нижних конечностей
2. генерализованную гипотонию мышц в сочетании с нарушением ритма дыхания
3. повышение мышечного тонуса в сгибателях верхних конечностей и разгибателях нижних конечностей
4. повторяющиеся пароксизмы повышения мышечного тонуса в разгибателях конечностей

Правильный ответ: 4 - повторяющиеся пароксизмы повышения мышечного тонуса в разгибателях конечностей

Вопрос 3

ПАРАЛИЧ ДЮШЕННА-ЭРБА ВОЗНИКАЕТ ПРИ ПОРАЖЕНИИ _____ КОРЕШКОВ СПИННОМОЗГОВЫХ НЕРВОВ

1. C8-D2
2. C5-C6
3. C7
4. D3-D7

Правильный ответ: 2 - C5-C6

Вопрос 4

ПРИ ДЕМЕНЦИИ С ТЕЛЬЦАМИ ЛЕВИ, В ОТЛИЧИЕ ОТ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА, ТЕЛЬЦА ЛЕВИ ОБНАРУЖИВАЮТСЯ В

1. дорсальном моторном ядре блуждающего нерва
2. черной субстанции
3. конвекситальных отделах коры
4. ядрах боковых рогов спинного мозга

Правильный ответ: 3 - конвекситальных отделах коры

Вопрос 5

ДИАГНОЗ СИНДРОМА ГИЙЕНА-БАРРЕ НЕОБХОДИМО ПОСТАВИТЬ ПОД СОМНЕНИЕ, ЕСЛИ У БОЛЬНОГО НАБЛЮДАЮТ РАЗВИТИЕ

1. бульбарных нарушений

- 2. вегетативной недостаточности
- 3. сочетанных дистальных и проксимальных парезов
- 4. психопатологических симптомов

Правильный ответ: 4 - психопатологических симптомов

Вопрос 6

ДЛЯ КАРТИНЫ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ ПРИ РАССЕЯННОМ СКЛЕРОЗЕ ХАРАКТЕРНЫ ОЧАГИ

- 1. асимптомные в области базальных ядер
- 2. накапливающие и не накапливающие контраст
- 3. крупные сливные
- 4. с вовлечением серого вещества

Правильный ответ: 2 - накапливающие и не накапливающие контраст

Вопрос 7

ДЛЯ ВРОЖДЕННОЙ ЮНОШЕСКОЙ ТОРСИОННОЙ ДИСТОНИИ ХАРАКТЕРНО НАЛИЧИЕ

- 1. пирамидно-мозжечкового синдрома
- 2. акинетико-ригидного синдрома
- 3. синдрома сенситивной атаксии
- 4. вестибуло-мозжечкового синдрома

Правильный ответ: 2 - акинетико-ригидного синдрома

Вопрос 8

К ГИПЕРКИНЕЗАМ, КОТОРЫЕ МОЖНО ЗАДЕРЖАТЬ НА НЕКОТОРОЕ ВРЕМЯ УСИЛИЕМ ВОЛИ, ОТНОСЯТ

- 1. хорею
- 2. тики
- 3. тремор
- 4. миоклонию

Правильный ответ: 2 - тики

Вопрос 9

ПРИ ТЯЖЁЛОЙ ЧЕРЕПНО-МОЗГОВОЙ ТРАВМЕ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ТРОМБОЭМБОЛИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ И ТРОМБОЭМБОЛИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ ПРИМЕНЯЮТ

- 1. гиперосмолярные растворы для дегидратации
- 2. низкомолекулярные гепарины
- 3. нейтропротекторы
- 4. антифибринолитики

Правильный ответ: 2 - низкомолекулярные гепарины

Вопрос 10

ПАРАЛИЧ ДЕЖЕРИН-КЛЮМПКЕ ВОЗНИКАЕТ ПРИ ПОРАЖЕНИИ _____ ПУЧКА ПЛЕЧЕВОГО СПЛЕТЕНИЯ

1. верхнего первичного
2. среднего первичного
3. заднего
4. нижнего первичного

Правильный ответ: 4 - нижнего первичного