



Нейрохирургия

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 03:43 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 03:39 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ПО ДАННЫМ КРУПНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПЯТИЛЕТНЯЯ БЕЗРЕЦИДИВНАЯ ВЫЖИВАЕМОСТЬ ПРИ АДЕКВАТНОМ ЛУЧЕВОМ ЛЕЧЕНИИ МЕНИНГИОМ WHO GRADE I СОСТАВЛЯЕТ ОКОЛО ____ %

1. 70
2. 100
3. 50
4. 90

Правильный ответ: 4 - 90

Вопрос 2

НАИБОЛЕЕ ЧАСТОЙ ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ ГЕРМИНОМ ЯВЛЯЕТСЯ

1. боковые желудочки
2. мозжечок
3. хиазмально-селлярная область
4. пинеальная область

Правильный ответ: 4 - пинеальная область

Вопрос 3

КЛЮЧЕВЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ, ОТЛИЧАЮЩИМ КИСТУ КАРМАНА РАТКЕ ОТ КРАНИОФАРИНГЕАЛЬНОЙ КИСТЫ ЯВЛЯЕТСЯ

1. выстилка многослойным эпителием
2. наличие так называемых, гигантских клеток в стенке краниофарингеальной кисты
3. выстилка однослойным кубическим эпителием
4. выстилка переходным эпителием

Правильный ответ: 3 - выстилка однослойным кубическим эпителием

Вопрос 4

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННОЙ ДОПЛЕРОГРАФИИ ПРИ ТРАНСНАЗАЛЬНОЙ ЭНДСКОПИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ НЕОБХОДИМО ДЛЯ

1. локализации сонной артерии
2. локализации ствола мозга
3. поиска венозных коллекторов основания черепа
4. определения тока ликвора

Правильный ответ: 1 - локализации сонной артерии

Вопрос 5

ПЯТИПРОЦЕНТНЫЙ РАСТВОР ГЛЮКОЗЫ ИМЕЕТ ОСМОЛЯРНСТЬ _____ МОСМ/Л

1. 285
2. 300
3. 800

4. 278

Правильный ответ: 1 - 285

Вопрос 6

ПО РЕШЕНИЮ ВРАЧЕБНОЙ КОМИССИИ ПРИ БЛАГОПРИЯТНОМ КЛИНИЧЕСКОМ И ТРУДОВОМ ПРОГНОЗЕ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ ПОСЛЕ ТРАВМ И РЕКОНСТРУКТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ МОЖЕТ БЫТЬ ВЫДАН И ПРОДЛЕН ДО ДНЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ТРУДОСПОСОБНОСТИ, НО НА СРОК НЕ БОЛЕЕ ____ МЕСЯЦЕВ С ДАТЫ НАЧАЛА ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

1. 6
2. 8
- 3 10
4. 9

Правильный ответ: 3 - 10

Вопрос 7

СУСТАВОМ КРЮВЕЛЬЕ ЯВЛЯЕТСЯ

1. атланто-затылочный сустав
2. боковой атланто-аксиальный сустав
- 3 сустав между передней дугой C1 и зубом CII
4. дугоотростчатый сустав

Правильный ответ: 3 - сустав между передней дугой C1 и зубом CII

Вопрос 8

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМ МЕТОДОМ ЛЕЧЕНИЯ КРУПНЫХ ВТОРИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ЛОКАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ОПУХОЛИ ЯВЛЯЕТСЯ

1. облучение всего головного мозга
2. стереотаксическая лучевая терапия в режиме гипофракционирования
- 3 хирургическое удаление с последующей лучевой терапией
4. хирургическое удаление

Правильный ответ: 3 - хирургическое удаление с последующей лучевой терапией

Вопрос 9

ПРИ СОЧЕТАННОЙ ТРАВМЕ ГОЛОВЫ И ДЛИННЫХ ТРУБЧАТЫХ КОСТЕЙ ПОВЫШАЕТСЯ ВЕРОЯТНОСТЬ

1. воздушной эмболии
2. эпилептических приступов
3. назальной ликвореи
- 4 жировой эмболии

Правильный ответ: 4 - жировой эмболии

Вопрос 10

ПРИ РАЗРУШЕНИИ БОЛЕЕ ЧЕМ 90% ИЛИ БОЛЕЕ НЕЙРОНОВ СУПРАОПТИЧЕСКОГО И ПАРАВЕНТРИКУЛЯРНОГО ЯДЕР РАЗВИВАЕТСЯ

- 1. несахарный диабет
- 2. гипопитуитаризм
- 3. третичный гипогонадизм
- 4. гиперпролактинемия

Правильный ответ: 1 - несахарный диабет