



Общая врачебная практика (семейная медицина)

Высшее образование

DOCX · PDF

Задач: 1

Вопросов: 12

Сформировано: 25.07.2026, 04:26 МСК · База обновлена: 23.07.2026, 21:24 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Ситуационная задача 0001

Образование: Высшее образование | Специальность: Общая врачебная практика (семейная медицина)

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Женщина 55 лет обратилась к врачу общей практики.

1.2. Жалобы

- * боли в паху, ягодицах, постоянные (выраженность боли по визуальной аналоговой шкале 4 балла), постепенно начинающиеся, беспокоящие в течение последнего месяца практически каждый день, усиливающиеся при ходьбе, уменьшающиеся в покое, сопровождающиеся утренней скованностью около 10 минут, "стартовые" боли, боли в латеральных отделах верхней трети бедра,
- * невозможность лежать на боку из-за усиления болей,
- * ограничение движений в тазобедренных суставах.

1.3. Анамнез заболевания

Считает себя больной около 10 лет, когда впервые появились боли в паху. Сначала боли возникали только после значительной физической нагрузки, затем приобрели постоянный характер, появилось ограничение в движении в тазобедренных суставах. За медицинской помощью с данными симптомами ранее не обращалась, по совету сестры принимала парацетамол без эффекта.

1.4. Анамнез жизни

- * Работает кладовщицей на заводе.
- * Семейный анамнез: у матери и сестры двусторонний коксартроз.
- * Аллергических реакций не было.
- * Из хронических заболеваний: гипертоническая болезнь 2 стадии, ГЛЖ. Риск 3 (высокий), принимает амлодипин, отмечает частые эпизоды повышения артериального давления до 160/90 мм рт.ст.
- * Наличие туберкулеза, хронических инфекций, сахарного диабета отрицает.
- * Не курит, алкоголем не злоупотребляет.

1.5. Объективный статус

Состояние удовлетворительное. Сознание ясное.

Гиперстенического телосложения. Рост 176, вес 90 кг (ИМТ 29,12 кг/м²).

Кожные покровы и видимые слизистые физиологической окраски.

В легких дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД 16 движений в минуту. Аускультативно тоны сердца ясные, сердцебиения ритмичные. АД 148/84 мм рт.ст. ЧСС 75 уд/мин. Патологических шумов нет. Границы относительной сердечной тупости не изменены.

Живот мягкий, безболезненный, печень и селезенка не пальпируются.

Почки не пальпируются. Мочеиспускание свободное, безболезненное. Стул не изменен.

Костно-мышечная система: ограничение и болезненность при внутренней ротации тазобедренных суставов в согнутом положении, увеличение суставов в объеме, наличие крепитации, болезненность при пальпации паховой области, латеральные места пульсации бедренной артерии.

1. План обследования

Вопрос 1.

Для оценки воспаления необходимо исследовать

1. С-реактивный белок
2. сывороточный уровень С3-фракции комплемента
3. сывороточный уровень антител к нативной ДНК
4. СОЭ
5. уровень мочевой кислоты
6. уровень свободных легких цепей иммуноглобулинов

Правильные ответы: 1 — С-реактивный белок; 4 — СОЭ

Для выявления воспаления необходимо исследовать СОЭ и С-реактивный протеин. Умеренное повышение характерно для вторичного синовита на фоне ОА

Клинические рекомендации Минздрава России. Остеоартроз, 2016 (1)

Для выявления воспаления необходимо исследовать СОЭ и С-реактивный протеин. Умеренное повышение характерно для вторичного синовита на фоне ОА.

Клинические рекомендации Минздрава России. Остеоартроз, 2016 (1)

Вопрос 2.

Для постановки диагноза и определения стадии пациентке следует провести

1. ультразвуковое исследование тазобедренных суставов
2. рентгенографию поясничного отдела позвоночника в положении стоя
3. сцинтиграфию суставов
4. рентгенологическое исследование костей таза

Правильный ответ: 4 — рентгенологическое исследование костей таза

Рентгенологическое исследование — наиболее достоверный метод диагностики ОА, который выявляет сужение суставной щели, краевые остеофиты и заострение мыщелков большеберцовой кости, субхондральный склероз.

При подозрении на ОА тазобедренного сустава необходимо проводить рентгенологическое исследование костей таза с захватом обоих тазобедренных суставов (уровень С).

Клинические рекомендации Минздрава России. Остеоартроз, 2016 (1)

2. Диагноз

Вопрос 3.

Наиболее вероятным диагнозом является

1. Остеоартроз
2. Ревматическая полимиалгия
3. Остеохондропатия головки бедренной кости
4. Туберкулезный коксит

Правильный ответ: 1 — Остеоартроз

а| Признаки а| Оценка

а| Комбинация клинических и рентгенологических критериев а| 1 + 2 других критерия из 3 (2,3,4)
а| * Боль в тазобедренном суставе а| Чувствительность – 89%
а| * Остеофиты в области бедренной головки и/или вертлужной впадине а| Специфичность – 91%
а| * СОЭ ≤ 20 мм/ч (по Вестегрену) а|
а| * Сужение суставной щели а|
{nbsp}

Клинические рекомендации Минздрава России. Остеоартроз, 2016 (1)

Вопрос 4.

Данные рентгенологического исследования (субхондральный склероз вертлужной впадины; множественные остеофиты по верхнему и нижнему краю вертлужной впадины; умеренное сужение суставной щели) соответствуют +____+ стадии остеоартроза

1. I
2. IV
3. III
4. II

Правильный ответ: 3 — III

Классификация рентгенологических изменений при остеоартрите Келлгрена и Лоуренса (1957)

0 Изменения отсутствуют

I Сомнительные рентгенологические признаки

II Минимальные изменения (небольшое сужение суставной щели, единичные остеофиты)

III Умеренные проявления (умеренное сужение суставной щели, множественные остеофиты)

IV Выраженные изменения (суставная щель почти не прослеживается, выявляются грубые остеофиты)

Клинические рекомендации Минздрава России. Остеоартроз, 2016 (1)

Вопрос 5.

Пациентка имеет ИМТ 29,12 кг/м², что соответствует

1. ожирению 2 степени
2. ожирению 1 степени
3. избыточной массе тела
4. нормальному весу

Правильный ответ: 3 — избыточной массе тела

Избыточный вес 25-29,9 кг/м²

Клинические рекомендации Минздрава России. Ожирение, 2024 г. (1)

3. Лечение

Вопрос 6.

Из нефармакологических методов пациентке следует рекомендовать

- ☒ 1. снизить вес
2. не принимать горизонтальное положение после приема пищи
3. отказаться от курения
4. ограничить употребление соли менее 1 грамма в сутки

Правильный ответ: 1 — снизить вес

Больным с ОА рекомендовано оптимизировать рацион питания. Пациентам с избыточным весом (ИМТ более 25 кг/м²) рекомендовано снижение массы тела не менее чем на 5% за 6 месяцев или 10% за год

Клинические рекомендации Минздрава России. Остеоартроз, 2016 (1)

Вопрос 7.

Для снижения веса пациентке следует рекомендовать достигнуть дефицита калорий в размере около +____+ ккал от физиологической потребности

1. 100-200
2. 800-1000
3. 250-350
- ☒ 4. 500-700

Правильный ответ: 4 — 500-700

Для снижения массы тела рекомендуется гипокалорийная диета (дефицит 500-700 ккал от физиологической потребности с учетом массы тела, возраста и пола), сбалансированная по пищевым ингредиентам.

Клинические рекомендации Минздрава России. Ожирение, 2024 г. (1)

Вопрос 8.

С целью купирования болей пациентке следует назначить

1. трамадол
2. хондроитин сульфат
3. стронция ранелат
- ☒ 4. нестероидные противовоспалительные препараты

Правильный ответ: 4 — нестероидные противовоспалительные препараты

НПВП применяют в случае неэффективности парацетамола.

Клинические рекомендации Минздрава России. Остеоартроз, 2016 (1)

Вопрос 9.

Препаратом выбора из группы нестероидных противовоспалительных препаратов у данной пациентки является

- ☒ 1. напроксен
2. диклофенак

3. нимесулид
4. ксифокам

Правильный ответ: 1 — напроксен

Пациентка имеет высокий ССС риск вследствие некомпенсированной артериальной гипертензии. Наиболее безопасным НПВП в отношении риска кардиоваскулярных катастроф является напроксен.

При умеренном ССС – риске следует использовать с-НПВП в комбинации с низкими дозами аспирина или н-НПВП (напроксен, ацеклофенак, кетопрофен, ибупрофен); при высоком риске – напроксен или целекоксиб в сочетании с низкими дозами аспирина

Рекомендации по применению нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) при ревматических заболеваниях, 2016

Рекомендации по применению нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) при ревматических заболеваниях. Ассоциация ревматологов России. 2016 (1)

Вопрос 10.

Пациентка на приеме через месяц, продолжает прием НПВП, ей следует провести

- ① СМАД
2. эхоКГ
3. ЭКГ
4. стресс-ЭКГ

Правильный ответ: 1 — СМАД

ЭГДС и СМАД следует провести через 1-3 месяца после начала приема НПВП всем больным, имеющим ЖКТ и ССС факторы риска.

Рекомендации по применению нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) при ревматических заболеваниях, 2016

Рекомендации по применению нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) при ревматических заболеваниях. Ассоциация ревматологов России. 2016 (1)

4. Вариатив

Вопрос 11.

К симптоматическим лекарственным средствам медленного действия при остеоартрите относится

1. алендронат
2. диклофенак
3. преднизолон
- ④ хондроитин-сульфат

Правильный ответ: 4 — хондроитин-сульфат

Назначение препаратов, содержащие хондроитин сульфат и глюкозамин сульфат или их комбинацию, рекомендовано для уменьшения боли, улучшения функции суставов.

Клинические рекомендации Минздрава России. Остеоартроз, 2016 (1)

Вопрос 12.

У всех лиц, отвечающих антропометрическим критериям диагностики избыточного веса или ожирения, необходимо оценивать суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале

1 SCORE

2. GRACE

3. FRAX

4. CMDS

Правильный ответ: 1 — SCORE

У всех лиц, отвечающих антропометрическим критериям диагностики избыточного веса или ожирения, необходимо оценивать суммарный сердечно-сосудистый риск по шкале SCORE.

Диагностика, лечение, профилактика ожирения и ассоциированных с ним заболеваний (национальные клинические рекомендации), 2017

Диагностика, лечение, профилактика ожирения и ассоциированных с ним заболеваний (национальные клинические рекомендации). Российское кардиологическое общество. 2017 (1)