MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Общая врачебная практика (семейная медицина)

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 02:55 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПОТЕНЗИЯ БЕРЕМЕННЫХ МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К

1. **синдрому задержки роста плода**
2. преждевременному излитию околоплодных вод
3. маловодию
4. истмико-цервикальной недостаточности

Правильный ответ: 1 - синдрому задержки роста плода

Вопрос 2

ПОЯВЛЕНИЕ ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ПОДКОЖНОЙ ЭМФИЗЕМЫ В ПРАВОЙ ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

1. разрыва мочевого пузыря
2. **прободной язвы или повреждения забрюшинной части двенадцатиперстной кишки**
3. ранения диафрагмы
4. напряженного пневмоторакса

Правильный ответ: 2 - прободной язвы или повреждения забрюшинной части двенадцатиперстной кишки

Вопрос 3

БОЛЬНОМУ СО СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ, СТРАДАЮЩЕМУ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ

1. нитросорбид
2. ивабрадин
3. бисопролол
4. **амлодипин**

Правильный ответ: 4 - амлодипин

Вопрос 4

ПРИ ПАРКИНСОНИЗМЕ НАБЛЮДАЮТ

1. повышение мышечного тонуса по спастическому типу
2. появление гиперкинезов
3. появление патологических рефлексов
4. **гипокинезию, гипомимию**

Правильный ответ: 4 - гипокинезию, гипомимию

Вопрос 5

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМИ МЕТОДАМИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЮТСЯ

1. обзорная рентгенография органов брюшной полости и зофагогастродуоденоскопия с биопсией
2. **ультразвуковое исследование органов брюшной полости и компьютерная томография с контрастированием**
3. рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта с контрастированием и электроинтестинография
4. эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография и радиотелеметрическое исследование пищеварительного тракта

Правильный ответ: 2 - ультразвуковое исследование органов брюшной полости и компьютерная томография с контрастированием

Вопрос 6

КАРВЕДИЛОЛ ЯВЛЯЕТСЯ

1. **неселективным бета- и альфа-адреноблокатором**
2. высокоселективным альфа- и бета-адреноблокатором
3. неселективным бета1-блокатором с вазодилатирующими свойствами
4. высокоселективным бета1-блокатором с вазодилатирующими свойствами

Правильный ответ: 1 - неселективным бета- и альфа-адреноблокатором

Вопрос 7

К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ КРАСНУХИ В СРАВНЕНИИ С КОРЬЮ ОТНОСЯТ

1. катаральные явления верхних дыхательных путей
2. неизмененный фон кожи
3. увеличение шейных лимфатических узлов
4. **отсутствие этапности высыпаний в период разгара болезни**

Правильный ответ: 4 - отсутствие этапности высыпаний в период разгара болезни

Вопрос 8

У ПАЦИЕНТА С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, ПОЛУЧАЮЩЕГО КОРОТКОДЕЙСТВУЮЩИЕ β2–АГОНИСТЫ (КДБА) ПО ПОКАЗАНИЯМ, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СРЕДНЕТЯЖЁЛОГО ОБОСТРЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕПАРАТОВ ПЕРВОЙ ЛИНИИ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

1. многократное применение ингаляционных КДБА в комбинации с теофиллином
2. многократное применение ингаляционных клюкокортикостероидов (ИГКС) в средних дозах или сочетание ИГКС с ипратропия бромидом
3. однократное внутримышечное введениее высокой дозы глюкокортикостероида, затем многократное применение ингаляционного КДБА
4. **многократное применение ингаляционных КДБА или комбинации КДБА и ипратропия бромида**

Правильный ответ: 4 - многократное применение ингаляционных КДБА или комбинации КДБА и ипратропия бромида

Вопрос 9

К ПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ С УГЛЕКИСЛЫМИ ВОДАМИ ОТНОСЯТ

1. пороки аортального клапана
2. сочетанный митральный порок с преобладанием стеноза
3. **стабильную стенокардию I ФК**
4. недостаточность кровообращения II Б стадии

Правильный ответ: 3 - стабильную стенокардию I ФК

Вопрос 10

НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПРОГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ У БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

1. политопная желудочковая экстрасистолия
2. мерцательная аритмия
3. ранняя желудочковая экстрасистолия
4. **групповая желудочковая экстрасистолия**

Правильный ответ: 4 - групповая желудочковая экстрасистолия