



Общая врачебная практика (семейная медицина)

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 04:01 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 03:51 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПОТЕНЗИЯ БЕРЕМЕННЫХ МОЖЕТ ПРИВОДИТЬ К

- ☒ 1. синдрому задержки роста плода
2. преждевременному излитию околоплодных вод
3. маловодию
4. истмико-цервикальной недостаточности

Правильный ответ: 1 - синдрому задержки роста плода

Вопрос 2

ПОЯВЛЕНИЕ ЛОКАЛИЗОВАННОЙ ПОДКОЖНОЙ ЭМФИЗЕМЫ В ПРАВОЙ ПОЯСНИЧНОЙ ОБЛАСТИ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

1. разрыва мочевого пузыря
- ☒ 2. прободной язвы или повреждения забрюшинной части двенадцатиперстной кишки
3. ранения диафрагмы
4. напряженного пневмоторакса

Правильный ответ: 2 - прободной язвы или повреждения забрюшинной части двенадцатиперстной кишки

Вопрос 3

БОЛЬНОМУ СО СТЕНОКАРДИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ, СТРАДАЮЩЕМУ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ, СЛЕДУЕТ НАЗНАЧИТЬ

1. нитросорбид
2. ивабрадин
3. бисопролол
- ☒ 4. амлодипин

Правильный ответ: 4 - амлодипин

Вопрос 4

ПРИ ПАРКИНСОНИЗМЕ НАБЛЮДАЮТ

1. повышение мышечного тонуса по спастическому типу
2. появление гиперкинезов
3. появление патологических рефлексов
- ☒ 4. гипокинезию, гипомимию

Правильный ответ: 4 - гипокинезию, гипомимию

Вопрос 5

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМИ МЕТОДАМИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИКИ ХРОНИЧЕСКОГО ПАНКРЕАТИТА ЯВЛЯЮТСЯ

1. обзорная рентгенография органов брюшной полости и эзофагогастродуоденоскопия с биопсией

- 2. ультразвуковое исследование органов брюшной полости и компьютерная томография с контрастированием
- 3. рентгенологическое исследование желудочно-кишечного тракта с контрастированием и электроинтестинография
- 4. эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография и радиотелеметрическое исследование пищеварительного тракта

Правильный ответ: 2 - ультразвуковое исследование органов брюшной полости и компьютерная томография с контрастированием

Вопрос 6

КАРВЕДИЛОЛ ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. неселективным бета- и альфа-адреноблокатором
- 2. высокоселективным альфа- и бета-адреноблокатором
- 3. неселективным бета1-блокатором с вазодилатирующими свойствами
- 4. высокоселективным бета1-блокатором с вазодилатирующими свойствами

Правильный ответ: 1 - неселективным бета- и альфа-адреноблокатором

Вопрос 7

К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНО-ДИАГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ КРАСНУХИ В СРАВНЕНИИ С КОРЬЮ ОТНОСЯТ

- 1. катаральные явления верхних дыхательных путей
- 2. неизменный фон кожи
- 3. увеличение шейных лимфатических узлов
- 4. отсутствие этапности высыпаний в период разгара болезни

Правильный ответ: 4 - отсутствие этапности высыпаний в период разгара болезни

Вопрос 8

У ПАЦИЕНТА С БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМОЙ, ПОЛУЧАЮЩЕГО КОРОТКОДЕЙСТВУЮЩИЕ β_2 -АГОНИСТЫ (КДБА) ПО ПОКАЗАНИЯМ, ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ СРЕДНЕТЯЖЁЛОГО ОБОСТРЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ПРЕПАРАТОВ ПЕРВОЙ ЛИНИИ СЛЕДУЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

- 1. многократное применение ингаляционных КДБА в комбинации с теофиллином
- 2. многократное применение ингаляционных глюкокортикостероидов (ИГКС) в средних дозах или сочетание ИГКС с ипратропия бромидом
- 3. однократное внутримышечное введение высокой дозы глюкокортикостероида, затем многократное применение ингаляционного КДБА
- 4. многократное применение ингаляционных КДБА или комбинации КДБА и ипратропия бромида

Правильный ответ: 4 - многократное применение ингаляционных КДБА или комбинации КДБА и ипратропия бромида

Вопрос 9

К ПОКАЗАНИЯМ ДЛЯ НАПРАВЛЕНИЯ НА БАЛЬНЕОЛОГИЧЕСКИЕ КУРОРТЫ С УГЛЕКИСЛЫМИ ВОДАМИ ОТНОСЯТ

- 1. пороки аортального клапана

- 2. сочетанный митральный порок с преобладанием стеноза
- 3. стабильную стенокардию I ФК
- 4. недостаточность кровообращения II Б стадии

Правильный ответ: 3 - стабильную стенокардию I ФК

Вопрос 10

НАИБОЛЕЕ НЕБЛАГОПРИЯТНЫМ ПРОГНОСТИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ У БОЛЬНЫХ С ИНФАРКТОМ МИОКАРДА ЯВЛЯЕТСЯ

- 1. политопная желудочковая экстрасистолия
- 2. мерцательная аритмия
- 3. ранняя желудочковая экстрасистолия
- 4. групповая желудочковая экстрасистолия

Правильный ответ: 4 - групповая желудочковая экстрасистолия