



Офтальмология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 26.09.2026, 04:30 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 04:23 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ПРЕПАРАТАМИ ПЕРВОГО ВЫБОРА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МАКУЛЯРНОГО ОТЕКА ПРИ УВЕИТАХ ЯВЛЯЮТСЯ

1. нестероидные противовоспалительные препараты
2. ингибиторы эндотелиального сосудистого фактора роста
3. глюкокортикоиды
4. ингибиторы карбоангидразы

Правильный ответ: 3 - глюкокортикоиды

Вопрос 2

НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДОМ ДИАГНОСТИКИ НОВООБРАЗОВАНИЙ КОНЪЮНКТИВЫ ГЛАЗНОГО ЯБЛОКА ЯВЛЯЕТСЯ

1. А-сканирование
2. офтальмоскопия
3. ультразвуковая биомикроскопия
4. В-сканирование

Правильный ответ: 3 - ультразвуковая биомикроскопия

Вопрос 3

К ОСОБО ТЯЖЕЛОЙ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЕ ГЛАЗА ОТНОСЯТ

1. травматический иридодиализ
2. гемофтальм
3. травматическую отслойку сетчатки
4. разрыв зрительного нерва

Правильный ответ: 4 - разрыв зрительного нерва

Вопрос 4

ВЫПОЛНИТЕ ТРАНСПОЗИЦИЮ ДАННЫХ РЕФРАКТОМЕТРИИ SPH +0,25 CYL +3,75 AX 175°, ИСПОЛЬЗУЯ МИНУСОВЫЙ ЦИЛИНДР

1. sph +4,5 cyl -4,00 ax 75°
2. sph +4,00 cyl -3,75 ax 85°
3. sph -0,25 cyl 3,75 ax 175°
4. sph +4,25 cyl -4,0 ax 85°

Правильный ответ: 2 - sph +4,00 cyl -3,75 ax 85°

Вопрос 5

ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКОМ СИНДРОМА АКСЕНФЕЛЬДА – РИГЕРА ЯВЛЯЕТСЯ

1. передний лентиконус
2. врожденная аниридия
3. колобома радужки
4. задний эмбриотоксон

Правильный ответ: 4 - задний эмбриотоксон

Вопрос 6

ПРИМЕНЕНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЙ ЛАЗЕРКОАГУЛЯЦИИ ПОКАЗАНО ПРИ _____ СЕТЧАТКИ

1. старой ригидной отслойке
2. тотальной отслойке
3. высокой отслойке
4. клапанном разрыве

Правильный ответ: 4 - клапанном разрыве

Вопрос 7

ДЛЯ ДОПУСКА К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТ, ЗАВЕРШИВШИЙ ОСВОЕНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ, ПРОХОДИТ ПРОЦЕДУРУ

1. аттестации
2. первичной специализированной аккредитации
3. периодической аккредитации
4. первичной аккредитации

Правильный ответ: 2 - первичной специализированной аккредитации

Вопрос 8

ПРИ ЯМКЕ ДИСКА ЗРИТЕЛЬНОГО НЕРВА РАЗВИВАЕТСЯ _____ ОТСЛОЙКА СЕТЧАТКИ

1. серозная
2. регматогенная
3. геморрагическая
4. тракционная

Правильный ответ: 1 - серозная

Вопрос 9

БОМБИРОВАННАЯ РАДУЖКА ПРИВОДИТ К РАЗВИТИЮ

1. кератита
2. отслойки сетчатки
3. вторичной глаукомы
4. катаракты

Правильный ответ: 3 - вторичной глаукомы

Вопрос 10

ЕСЛИ БОЛЬНОЙ РАЗЛИЧАЕТ ОПТОТИПЫ С ПЕРВОГО ПО ВОСЬМОЙ РЯД В ТАБЛИЦЕ СИВЦЕВА – ГОЛОВИНА С РАССТОЯНИЯ 5 МЕТРОВ, ТО ОСТРОТА ЗРЕНИЯ ПО ДЕСЯТИЧНОЙ ШКАЛЕ СОСТАВЛЯЕТ

1. 0,2
2. 1,0

3. 0,5

4 0,8

Правильный ответ: 4 - 0,8