



Оториноларингология

Высшее образование

DOCX · PDF

Задач: 1

Вопросов: 12

Сформировано: 25.07.2026, 04:42 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 04:23 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/@medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Ситуационная задача 0001

Образование: Высшее образование | Специальность: Оториноларингология

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Мужчина 30 лет обратился к врачу-оториноларингологу.

1.2. Жалобы

на

- * затруднение носового дыхания,
- * нарушение обоняния,
- * слизистые выделения из носа,
- * гнусавый голос.

1.3. Анамнез заболевания

Считает себя больным в течение 2 лет, когда появились указанные жалобы.

1.4. Анамнез жизни

- * Хронические заболевания отрицает.
- * Не курит, алкоголем не злоупотребляет.
- * Профессиональных вредностей не имел.
- * Аллергических реакций не было.
- * Отец и мать здоровы.

1.5. Объективный статус

Общее состояние удовлетворительное. Рост 175 см, масса тела 72 кг.

Объективно: в ушах, зеве, глотке, гортани патологических изменений не определяется. При риноскопии: носовое дыхание затруднено. Слизистая оболочка розовая, влажная, умеренно отечная. Нижние носовые раковины набухшие. В общем носовом ходе с двух сторон визуализируются округлые образования белесоватого цвета, легко смещаемые.

1. План обследования

Вопрос 1.

Для постановки диагноза рекомендуется выполнить инструментальные методы обследования

1. рентгенографию носа и околоносовых пазух
2. ультразвуковое исследование околоносовых пазух
3. рентгенографию носоглотки в боковой проекции
4. бактериологическое исследование отделяемого из носа
5. переднюю риноскопию
6. компьютерную томографию околоносовых пазух

Правильные ответы: 5 — переднюю риноскопию; 6 — компьютерную томографию околоносовых пазух

При передней риноскопии оценивают степень obturации общих и средних носовых ходов полипозной тканью, наличие отделяемого и выраженность отека слизистой оболочки.

Клинические рекомендации Минздрава России. Полипозный риносинусит, 2024 г. (1)

Уточняет распространенность полипозного процесса, наличие дефектов или аномалий внутриносовых структур, а также мультиспиральная КТ с мультипланарной реконструкцией (аксиальная, фронтальная и сагиттальная проекции).

Клинические рекомендации Минздрава России. Полипозный риносинусит, 2024 г. (1)

Вопрос 2.

Для постановки диагноза необходимо выполнить лабораторное исследование

1. полипозной ткани на содержание Ig E
2. полипозной ткани, гистологическое
3. слизи полости носа, цитологическое
4. образования на эозинофильную инфильтрацию эпителия

Правильный ответ: 2 — полипозной ткани, гистологическое

Рекомендовано проведение гистологического исследования полипозной ткани.

Клинические рекомендации Минздрава России. Полипозный риносинусит, 2024 г. (1)

Вопрос 3.

Полип полости носа состоит из + _____ + эпителия

1. поврежденного, метаплазированного
2. переходного
3. однослойного цилиндрического
4. многослойного плоского, ороговевающего

Правильный ответ: 1 — поврежденного, метаплазированного

С гистологической точки зрения носовой полип состоит из поврежденного, нередко метаплазированного эпителия, расположенного на утолщенной базальной мембране и отечной стромы, содержащей небольшое количество желез и сосудов и практически лишенной нервных окончаний.

Клинические рекомендации Минздрава России. Полипозный риносинусит, 2024 г. (1)

2. Диагноз

Вопрос 4.

Основным предполагаемым диагнозом является

1. Инородное тело полости носа
2. Аллергический ринит
3. Полип полости носа
4. Искривление перегородки носа

Правильный ответ: 3 — Полип полости носа

Согласно современной международной позиции, все формы хронического риносинусита разделяют на хронический риносинусит без полипов (chronic rhinosinusitis without nasal polyps – CRSsNP) хронический риносинусит с полипами (chronic rhinosinusitis with nasal polyps – CRSwNP).

В настоящий момент общепринятой классификации самого ПРС не существует. Ни один из предложенных вариантов не стал общепризнанным и не используется в рутинной клинической

практике. Однако существует деление ПРС на основании гистологического строения полипов, особенностей клинических проявлений и возможных этиологических факторов.

По гистологическому строению полипы делят на:

- * отечные, эозинофильные («аллергические»);
- * фиброзно-воспалительные (нейтрофильные);
- * железистые;
- * с атипией стромы.

По этиопатогенетическому принципу Г.З. Пискунов [1] предложил классифицировать ПРС следующим образом:

- * полипоз в результате нарушения аэродинамики в полости носа и ОНП;
- * полипоз в результате хронического гнойного воспаления слизистой оболочки полости носа и ОНП;
- * полипоз в результате грибкового поражения слизистой оболочки ОНП;
- * полипоз в результате нарушения метаболизма арахидоновой кислоты;
- * полипоз при муковисцидозе, синдроме Картагенера.

Клинические рекомендации Минздрава России. Полипозный риносинусит, 2024 г. (1) (2)

Вопрос 5.

Этиологически данная патология

- 1** является полиэтиологичным заболеванием
2. имеет генетическую предрасположенность
3. является бактериальным поражением
4. является вирусной болезнью

Правильный ответ: 1 — является полиэтиологичным заболеванием

Единой теории этиопатогенеза на сегодняшний день не существует. С большой долей уверенности можно говорить, что ПРС является полиэтиологичным заболеванием. При этом существуют локальные, ограниченные только слизистой оболочкой околоносовых пазух (ОНП) и системные формы заболевания, при которых полипоз сочетается с бронхиальной астмой (БА), непереносимостью нестероидных противовоспалительных средств (НПВС) (aspirin exacerbated respiratory disease – AERD), муковисцидозом, синдромом Картагенера и др. Хотя убедительных доказательных данных на этот счет нет, генетическая предрасположенность к развитию ПРС не отвергается.

Клинические рекомендации Минздрава России. Полипозный риносинусит, 2024 г. (1)

3. Лечение

Вопрос 6.

В качестве стартовой терапии пациенту следует назначить

1. противовирусную терапию
2. нестероидные противовоспалительные препараты
3. антибактериальную терапию
- 4** интраназальные глюкокортикостероиды

Правильный ответ: 4 — интраназальные глюкокортикостероиды

Рекомендовано в качестве стартовой терапии использовать интраназальные глюкокортикостероиды.

Клинические рекомендации Минздрава России. Полипозный риносинусит, 2024 г. (1)

Вопрос 7.

В случае недостаточной эффективности терапии интраназальными глюкокортикостероидами, раннего рецидива полипозного процесса или при наличии противопоказаний к операции рекомендуется использование + _____ + короткими курсами

1. антибактериальных препаратов
2. противовирусных препаратов
3. противовоспалительных препаратов
4. системных глюкокортикостероидов

Правильный ответ: 4 — системных глюкокортикостероидов

Рекомендовано в случае недостаточной эффективности терапии ИнГКС, раннего рецидива полипозного процесса или при наличии противопоказаний к операции использованию системных ГКС короткими курсами.

Клинические рекомендации Минздрава России. Полипозный риносинусит, 2024 г. (1)

Вопрос 8.

Целью хирургического лечения у данного пациента является

1. удаление полипа
2. коррекция формы наружного носа
3. восстановление обоняния
4. коррекция носового клапана

Правильный ответ: 1 — удаление полипа

Целью хирургического вмешательства в типичных случаях является удаление полипов, коррекция анатомических аномалий (деформация перегородки носа, гипертрофия носовых раковин и др.), ревизия и коррекция размеров соустьев ОНП, вскрытие и удаление клеток решетчатого лабиринта, пораженных полипозным процессом.

Клинические рекомендации Минздрава России. Полипозный риносинусит, 2024 г. (1)

Вопрос 9.

Данному пациенту рекомендуется хирургическое лечение в объеме

1. полипотомии с помощью петли
2. лазерной полипотомии
3. полипотомии шейвером
4. эндоскопической операции

Правильный ответ: 4 — эндоскопической операции

Рекомендована функциональная эндоскопическая хирургия.

Клинические рекомендации Минздрава России. Полипозный риносинусит, 2024 г. (1)

Вопрос 10.

Основной задачей врача-оториноларинголога является проведение комплексного лечения, позволяющего

1. устранить сухость в полости носа
2. предотвратить развитие внутричерепных осложнений
- 3** продлить бессимптомный период полипозного риносинусита
4. сохранить носовое дыхание и обонятельные ощущения

Правильный ответ: 3 — продлить бессимптомный период полипозного риносинусита

Основной задачей врача-оториноларинголога является проведение комплексного лечения, позволяющего продлить бессимптомный период полипозного риносинусита и улучшить качество жизни пациента. В некоторых случаях необходимы повторные и многократные щадящие эндоскопические вмешательства в полости носа и околоносовых пазухах. Пациентам с полипозным риносинуситом необходимо ежедневное применение местных гормональных препаратов, нередко пожизненное с небольшими перерывами.

Клинические рекомендации Минздрава России. Полипозный риносинусит, 2024 г. (1)

Вопрос 11.

В послеоперационном периоде пациенту целесообразно проводить

1. наблюдение в отделении в течении 7 дней
- 2** туалет носа под эндоскопическим контролем
3. наблюдение в отделении в течении 14 дней
4. промывание полости носа гипертоническими растворами

Правильный ответ: 2 — туалет носа под эндоскопическим контролем

Рекомендовано проводить комплексную реабилитацию больных полипозным риносинуситом после эндоскопической полисинусотомии, включающую туалет носа под эндоскопический контролем орошение сосудосуживающими и антисептическими препаратами.

Клинические рекомендации Минздрава России. Полипозный риносинусит, 2024 г. (1)

Вопрос 12.

Пациенту рекомендуется явка на контрольный осмотр в течение первого года после операции через каждые + _____ + месяца/ев

1. 1-2
2. 5
3. 6
- 4** 3-4

Правильный ответ: 4 — 3-4

Рекомендовано в течение первого года после операции проводить контрольные осмотры каждые 3-4 месяца.

Клинические рекомендации Минздрава России. Полипозный риносинусит, 2024 г. (1)