



Педиатрия (ПП)

Высшее образование

DOCX · PDF

Задач: 2

Вопросов: 24

Сформировано: 25.07.2026, 08:36 МСК · База обновлена: 19.07.2026, 20:26 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Содержание

Ситуационная задача 0001

Ситуационная задача 0002

Ситуационная задача 0001

Образование: Высшее образование | Специальность: Педиатрия (ПП)

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

На приеме участкового педиатра мальчик 6 лет с мамой.

1.2. Жалобы

Жалобы на зуд, высыпания на коже рук, ног, тела

1.3. Анамнез заболевания

Впервые высыпания на коже лица появились в возрасте 6 месяцев, когда в рацион ввели овсяную кашу. Ребенок был проконсультирован аллергологом-иммунологом, была скорректирована диета, рекомендованы эмоленты и назначена местная противовоспалительная терапия. Мама рекомендации врача выполняла не полностью, использовала только увлажняющие средства и соблюдала диетические рекомендации. Высыпания прошли за несколько месяцев, на их месте остались очаги депигментации. Год назад вновь появились гиперемизированные пятна с шелушением, которые локализовались изначально только в локтевых сгибах, затем распространились по всему телу. Беспокоит выраженный зуд. За этот период было 4 обострения, в терапии вновь использовали увлажняющие и антигистаминные средства с умеренным эффектом.

1.4. Анамнез жизни

- * родился от 2 нормально протекавшей беременности, срочных родов, вес 3600 г, рост 51 см, по Апгар 8/9 б
- * находился на естественном вскармливании до 12 месяцев, прикорм введен с 5 месяцев, отмечались высыпания на коже после введения овсяной каши, остальные продукты переносил без реакций
- * перенесенные заболевания: ОРВИ 4-5 раз в год с 3 лет
- * вакцинирован согласно Национальному календарю профилактических прививок;
- * наследственность отягощена: у матери поллиноз, у отца бронхиальная астма

1.5. Объективный статус

Состояние ближе к удовлетворительному, самочувствие умеренно страдает, мальчик периодически чешет локтевые сгибы и шею, не лихорадит. Аппетит и ночной сон сохранен. Кожные покровы сухие, гиперемизированные пятна с шелушением и эксфолиациями по всему телу, в локтевых сгибах лихеноидные папулы, подчеркнутый кожный рисунок на ладонях; видимые слизистые оболочки чистые, периферические лимфоузлы не пальпируются, в легких дыхание везикулярное, хрипов нет, сердечные тоны ясные, ритмичные, живот мягкий, безболезненный, печень и селезенка не увеличены, стул регулярный, оформленный, диурез в норме. Масса 18 кг, рост 125 см.



Объективный статус.png

1. План обследования

Вопрос 1.

Для выявления причинно-значимого фактора заболевания и постановки диагноза целесообразно выполнить

1. люминесцентную диагностику
2. биохимический анализ крови
3. клинический анализ крови
4. копрограмму
5. общий анализ мочи
6. определение аллергенспецифических IgE-антител в сыворотке крови

Правильные ответы: 3 — клинический анализ крови; 6 — определение аллергенспецифических IgE-антител в сыворотке крови

Рекомендуется всем пациентам общий анализ крови развернутый для диагностики заболеваний и состояний, являющихся противопоказаниями к проведению системной терапии atopического дерматита и для контроля безопасности проводимой системной терапии циклоспорином.

Клинические рекомендации Минздрава России. Атопический дерматит, 2024 г. (1)

Рекомендуется проведение аллергологического обследования пациентам с atopическим дерматитом с семейным и/или личным анамнезом аллергических заболеваний – пищевой аллергии, аллергического ринита, бронхиальной астмы, а также с указанием на обострение заболевания при контакте с аллергенами

Клинические рекомендации Минздрава России. Атопический дерматит, 2024 г. (1)

Вопрос 2.

Диагностика данного заболевания основывается преимущественно на

1. анамнестических данных
2. данных инструментального обследования
3. клинических данных
4. лабораторных данных

Правильный ответ: 3 — клинических данных

Диагностика атопического дерматита основывается преимущественно на клинических данных. Жалобы на зуд, сухость, шелушение и покраснение кожи, сыпь, отягощенный аллергологический анамнез, анамнез заболевания и результаты объективного осмотра, а также результаты проведенного обследования подтверждают диагноз.

Клинические рекомендации Минздрава России. Атопический дерматит, 2024 г. (1)

2. Диагноз

Вопрос 3.

Диагноз может быть сформулирован как

1. Хроническая крапивница, тяжелое течение, стадия обострения, бытовая сенсibilизация
2. Микробная экзема
3. Атопический дерматит, детская форма, среднетяжелое течение, стадия обострения, бытовая сенсibilизация
4. Аллергический контактный дерматит

Правильный ответ: 3 — Атопический дерматит, детская форма, среднетяжелое течение, стадия обострения, бытовая сенсibilизация

Диагностика атопического дерматита основывается преимущественно на клинических данных. Объективных диагностических тестов, позволяющих подтвердить диагноз, в настоящее время не существует. В данном случае жалобы на зуд, сухость, шелушение и покраснение кожи, сыпь, отягощенный аллергологический анамнез, анамнез заболевания и результаты объективного осмотра, а также результаты проведенного обследования подтверждают диагноз.

При среднетяжелом течении отмечается распространенный характер поражения. Частота обострений 3-4 раза в год с увеличением их продолжительности.

При распространенном АД площадь поражения составляет от 10 до 50%;

По стадиям течения АД выделяют: обострение, неполную ремиссию и ремиссию.

Клинические рекомендации Минздрава России. Атопический дерматит, 2024 г. (1)

Вопрос 4.

У данного пациента + _____ + клинико-морфологическая форма заболевания

1. лихеноидная
2. эритематозно-сквамозная с лихенизацией
3. пруригиозная
4. экссудативная

Правильный ответ: 2 — эритематозно-сквамозная с лихенизацией

У представленного ребенка кожные покровы сухие, гиперемизированные пятна с шелушением и эксфолиациями по всему телу, в локтевых сгибах лихеноидные папулы, подчеркнутый кожный

рисунок на ладонях.

Детский период атопического дерматита характеризуется высыпаниями, которые носят менее экссудативный характер, чем в младенческом периоде, и представлены воспалительными милиарными и/или лентикулярными папулами, папуло-везикулами и эритематозно-сквамозными элементами, локализующимися на коже верхних и нижних конечностей, в области запястий, предплечий, локтевых и подколенных сгибов, голеностопных суставов и стоп.

Клинические рекомендации Минздрава России. Атопический дерматит, 2024 г. (1)

Вопрос 5.

Дифференциальную диагностику следует проводить с

1. внезапной экзантемой
2. геморрагическим васкулитом
3. чесоткой
4. узловатой эритемой

Правильный ответ: 3 — чесоткой

Дифференциальный диагноз атопического дерматита проводят с Т-клеточной лимфомой кожи, хронической экземой, аллергическим и ирритантным контактным дерматитом, себорейным дерматитом, нуммулярной экземой, чесоткой, псориазом, ихтиозом, педикулезом, красным волдырем, дерматофитией, иммунодефицитными состояниями (Х-сцепленный синдром Вискотта-Олдрича, синдром гипериммуноглобулинемии Е) и др

Клинические рекомендации Минздрава России. Атопический дерматит, 2024 г. (1)

3. Лечение

Вопрос 6.

Средствами первой линии терапии у данного пациента являются

1. антибиотики
2. местные глюкокортикостероиды
3. противовирусные препараты
4. антигистаминные препараты

Правильный ответ: 2 — местные глюкокортикостероиды

Местные глюкокортикостероиды (МГК) рекомендуются как средства первой линии для лечения обострений атопического дерматита, а также препараты стартовой терапии при легкой, среднетяжелой и тяжелой формах заболевания.

Клинические рекомендации Минздрава России. Атопический дерматит, 2024 г. (1)

Вопрос 7.

При применении влажных повязок с топическими глюкокортикоидами средней и высокой силы действия существует риск

1. вторичного инфицирования
2. привыкания
3. угнетения функции надпочечников
4. ожога

Правильный ответ: 3 — угнетения функции надпочечников

Следует соблюдать осторожность при использовании глюкокортикоидов, применяемых в дерматологии, средней и высокой силы действия с применением влажных повязок в связи с риском угнетения функции надпочечников

Клинические рекомендации Минздрава России. Атопический дерматит, 2024 г. (1)

Вопрос 8.

Антигистаминные препараты 2 поколения рекомендуют для

- ① устранения кожного зуда
2. седативного эффекта
3. профилактики обострения заболевания
4. купирования кожных высыпаний

Правильный ответ: 1 — устранения кожного зуда

Антигистаминные препараты 2 поколения назначают для уменьшения кожного зуда.

Клинические рекомендации Минздрава России. Атопический дерматит, 2024 г. (1)

Вопрос 9.

Диета с исключением аллергенных продуктов при лечении данного пациента

1. рекомендована, так как выявлена сенсibilизация к пищевым аллергенам
2. заключается в исключении продуктов, содержащих белок коровьего молока
3. заключается в исключении косточковых фруктов
- ④ не рекомендована, так как не доказана связь обострения заболевания с пищевой аллергией

Правильный ответ: 4 — не рекомендована, так как не доказана связь обострения заболевания с пищевой аллергией

Диета с исключением аллергенных продуктов не рекомендована, так как не доказана связь обострения заболевания с пищевой аллергией.

Клинические рекомендации Минздрава России. Атопический дерматит, 2024 г. (1)

Рекомендуется элиминация или удаление причинно-значимых аллергенов. При установленной сенсibilизации к бытовым, эпидермальным, грибковым аллергенам рекомендованы элиминационные мероприятия с целью уменьшения выраженности симптомов атопического дерматита, снижения фармакологической нагрузки и профилактики обострения.

(2)

Вопрос 10.

Показанием для госпитализации в данном случае будет

1. отягощенный наследственный анамнез по атопии
2. возраст больного меньше 5 лет
3. сопутствующая гастроэнтерологическая патология
- ④ присоединение вторичной инфекции, не купируемое в амбулаторных условиях

Правильный ответ: 4 — присоединение вторичной инфекции, не купируемое в амбулаторных условиях

Показания для оказания медицинской помощи в стационарных условиях:

* отсутствие эффекта от проводимого лечения в амбулаторных условиях; +

- * тяжелое течение атопического дерматита, требующее системной терапии или фототерапии; +
- * присоединение вторичной инфекции, не купируемое в амбулаторных условиях; +
- * развитие вирусной инфекции (герпетической экземы Капоши).

Клинические рекомендации Минздрава России. Атопический дерматит, 2024 г. (1)

Вопрос 11.

После уменьшения симптомов тяжелого обострения одним из препаратов выбора у данного пациента является

1. цинковая паста
2. клотримазол
3. фузидиевая кислота
- ④ пимекролимус

Правильный ответ: 4 — пимекролимус

Пимекролимус крем для наружного применения показан как для кратковременного, так и длительного лечения атопического дерматита легкой и средней степени тяжести у взрослых, подростков и детей (от 3-х месяцев). Возможно длительное применение по интермиттирующей схеме (1 раз в неделю или реже). Противопоказанием к назначению пимекролимуса является детский возраст до 3 месяцев.

Клинические рекомендации Минздрава России. Атопический дерматит, 2024 г. (1)

4. Вариатив

Вопрос 12.

В стадию ремиссии данному пациенту необходимы

1. пробиотики, сорбенты
- ② элиминационные мероприятия, уход за кожей
3. противовоспалительные препараты
4. антигистаминные препараты

Правильный ответ: 2 — элиминационные мероприятия, уход за кожей

Рекомендуется всем пациентам с атопическим дерматитом независимо от степени тяжести: увлажняющие и смягчающие средства (эмоленты) наружно. При выявленной сенсibilизации рекомендовано элиминировать триггерный фактор.

Клинические рекомендации Минздрава России. Атопический дерматит, 2024 г. (1) (2)

Ситуационная задача 0002

Образование: Высшее образование | Специальность: Педиатрия (ПП)

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Мама с 3-хлетним сыном на приеме у участкового педиатра

1.2. Жалобы

Неустойчивый стул с неприятным запахом, выраженное вздутие живота, низкая прибавка в весе, отставание в нервно-психическом развитии, в течение последнего года. После употребления каши и хлеба мама замечает нарушение стула и увеличение размеров живота.

1.3. Анамнез заболевания

Ребенок болен около 1 года, когда впервые мама обратила внимание на разжижение стула, выраженный метеоризм и увеличение размеров живота после употребления овсяной и пшеничных каш, хлебобулочных изделий. На профилактических осмотрах педиатр обратил внимание на низкую прибавку массы тела и снижение темпов роста у ребенка. Была рекомендована консультация эндокринолога и гастроэнтеролога, однако мать не посетила с ребенком данных специалистов.

1.4. Анамнез жизни

- * Ребенок от 1-й беременности, протекавшей на фоне угрозы прерывания в 1-м триместре. Роды 1, самостоятельные, срочные. Масса 3470 гр., длина 53 см. К груди приложили в родильном зале. Неонатальный скрининг пройден, аудиоскрининг пройден. Период новорожденности протекал без особенностей.
- * На грудном вскармливании до 3 месяцев, далее искусственное вскармливание, прикормы введены с 5 мес., вначале овощное пюре (брокколи), затем гречневая каша.
- * Вакцинация выполнена в соответствии с Национальным календарем прививок.
- * Аллергологический анамнез отягощен медикаментозной аллергией: на амоксициллин крапивница.
- * Перенесенные заболевания: ОРВИ до 4-5 р/год, ветряная оспа в 2 года. Травм и операций не было, гемотрансфузии не проводились.
- * Семейный анамнез отягощен патологией ЖКТ по линии отца ребенка: отец - хронический гастродуоденит, дедушка по линии отца язвенная болезнь ДПК.

1.5. Объективный статус

- * Общее состояние средней тяжести.
- * Вес 11,000 г (< -2 SDS)
- * Длина тела 88 см (<-2SDS)
- * Мальчик пониженного питания. Кожные покровы бледно-розовые, чистые, умеренной влажности. Видимые слизистые оболочки физиологической окраски, чистые. Небные дужки и задняя стенка глотки не гиперемизированы. Подкожная клетчатка развита недостаточно, распределена равномерно.
- * Периферические лимфатические узлы не пальпируются. Костная система: выраженных деформаций нет. У ребенка отмечается диффузная, мышечная дистония. Движения в суставах в полном объеме, островоспалительные изменения отсутствуют.
- * Носовое дыхание свободное. В легких дыхание пуэрильное, проводится во все отделы, хрипов нет. ЧДД 26/мин.
- * Область сердца визуально не изменена. Тоны сердца ясные, звучные, ритмичные, шумов нет. ЧСС 104/мин.
- * Аппетит сохранен. Живот округлой формы, увеличен в объеме за счет выраженной аэроколии. При пальпации живот мягкий, доступен пальпации во всех отделах. Печень +1,5 см из-под края реберной дуги, селезенка не пальпируется.
- * Со слов мамы, сегодня был однократно обильный зловонный стул, оформленный, без патологических примесей.
- * Мочеиспускание у ребенка свободное, безболезненное. Дизурических явлений нет.

1. План обследования

Вопрос 1.

Для постановки диагноза необходимыми лабораторными методами обследования являются

1. определение антител к эндомиозию, IgA
2. общий Ig E
3. копрограмма
4. общий анализ крови
5. общий анализ мочи
6. определение антител к тканевой транслугтаминазе IgA

Правильные ответы: 1 — определение антител к эндомиозию, IgA; 6 — определение антител к тканевой транслугтаминазе IgA

Рекомендуется определение уровня специфических антител класса IgG (anti-tTG, EMA, anti- DPG) у пациентов с подтвержденным низким уровнем общего IgA.

Антитела к эндомиозию (EMA) в качестве своего субстрата также имеют тканевую транслугтаминазу, расположенную в межклеточном веществе, окружающем гладкомышечные элементы собственной пластинки слизистой оболочки тонкой кишки. EMA определяются методом непрямой иммунофлуоресценции с использованием в качестве субстрата тканей пищевода обезьян или пуповины человека. Метод полуколичественный, имеет высокую чувствительность и специфичность, однако требует специального оборудования, а оценка результатов исследования является субъективной и зависит от квалификации специалистов.

Клинические рекомендации. Союз педиатров России. Целиакия, 2021 (1) (2)

Рекомендуется определение уровня специфических антител класса IgG (anti-tTG, EMA, anti- DPG) у пациентов с подтвержденным низким уровнем общего IgA.

Антитела к тканевой транслугтаминазе (anti-tTG) определяют иммуноферментным методом. Метод характеризуется высокой чувствительностью (98%).

Клинические рекомендации. Союз педиатров России. Целиакия, 2021 (1) (2)

Вопрос 2.

Необходимыми для постановки диагноза инструментальным методом обследования является

1. эзофагофиброгастродуоденоскопия с биопсией
2. обзорный рентгеновский снимок брюшной полости
3. ректороманоскопия с биопсией
4. УЗИ органов брюшной полости

Правильный ответ: 1 — эзофагофиброгастродуоденоскопия с биопсией

Рекомендуется: выполнение эндоскопического исследования с забором биоптатов слизистой тонкой кишки пациентам с сильным подозрением на целиакию и/или повышением концентрации специфических антител в сыворотке для гистологической верификации диагноза целиакии

Клинические рекомендации. Союз педиатров России. Целиакия, 2021 (1)

2. Диагноз

Вопрос 3.

На основании клинической картины заболевания и результатов проведенных обследований можно поставить диагноз

1. Целиакия симптомная, период манифестации
2. Болезнь Крона неуточненная
3. Гастроинтестинальная форма пищевой аллергии
4. Муковисцидоз, кишечная форма

Правильный ответ: 1 — Целиакия симптомная, период манифестации

В клинической картине целиакии, в настоящее время целесообразнее выделять симптомные (с гастроэнтерологическими симптомами и/или внекишечными проявлениями) и бессимптомные формы заболевания. У пациентов с бессимптомной (скрытой) формой целиакии отсутствуют какие-либо проявления заболевания. Диагноз в этом случае устанавливается в ходе скрининговых исследований или при обследовании родственников/пациентов из групп риска.

Выделяют периоды заболевания: латентный, клинической манифестации (активный), ремиссии

Клинические рекомендации. Союз педиатров России. Целиакия, 2021 (1)

Вопрос 4.

Пациентам с неуточненным диагнозом (в сыворотке отсутствует повышенный уровень специфических антител, при этом выявлены характерные для целиакии морфологические изменения) рекомендуется назначить

1. УЗИ органов брюшной полости
2. элиминационную диету
3. иммунологическое обследование
4. генетическое исследование

Правильный ответ: 4 — генетическое исследование

Рекомендуется выполнение генетического исследования пациентам с неуточненным диагнозом (в т.ч. при выявлении характерных для целиакии морфологических изменений при отсутствии повышенного уровня специфических антител в сыворотке). Отсутствие генов HLA-DQ2/DQ8 у данных пациентов свидетельствует об отсутствии у ребенка целиакии (в т.ч. серонегативной) и определяет необходимость продолжения диагностического поиска

Клинические рекомендации. Союз педиатров России. Целиакия, 2021 (1)

3. Лечение

Вопрос 5.

Основой лечения ребенка с данной патологией является

1. строгая пожизненная безлактозная диета
2. пожизненный прием полиферментных препаратов
3. своевременная коррекция микробиоты кишечника
- ④ 4. строгая пожизненная безглютеновая диета

Правильный ответ: 4 — строгая пожизненная безглютеновая диета

Единственным методом лечения целиакии и профилактики ее осложнений в настоящее время является строгая пожизненная безглютеновая диета.

Клинические рекомендации. Союз педиатров России. Целиакия, 2021 (1)

Вопрос 6.

На данном этапе тактика ведения данного больного предполагает

1. проведение диагностических мероприятий в условиях дневного стационара
- ② 2. госпитализацию в гастроэнтерологическое отделение
3. наблюдение за пациентом в амбулаторных условиях
4. госпитализацию в инфекционное отделение

Правильный ответ: 2 — госпитализацию в гастроэнтерологическое отделение

Рекомендуется: госпитализировать в стационар детей с выраженными проявлениями синдрома мальабсорбции (тяжелая нутритивная недостаточность, нарушения водно-электролитного обмена) для проведения полной диагностической программы, коррекции метаболических нарушений, проведения энтерального/парентерального питания, подбора индивидуального варианта безглютеновой диеты, реабилитационных мероприятий

Клинические рекомендации. Союз педиатров России. Целиакия, 2021 (1)

Вопрос 7.

Какие препараты могут быть назначены пациенту с целиакией на фоне выраженной диареи

- ① 1. мукоцитопротекторы
2. прокинетики
3. ферменты
4. сорбенты

Правильный ответ: 1 — мукоцитопротекторы

Медикаментозная терапия при целиакии носит вспомогательный характер, но в ряде случаев может быть жизненно необходимой. В основном она направлена на коррекцию дефицитных состояний, метаболических нарушений, развившихся на фоне синдрома мальабсорбции

Рекомендуется использование мукоцитопротекторов – адсорбентов на фоне выраженной диареи

Клинические рекомендации. Союз педиатров России. Целиакия, 2021 (1)

Вопрос 8.

В рационе питания данного ребенка рекомендовано использовать каши

1. рисовую, манную, кукурузную
2. ячневую, овсяную, манную
- 3. кукурузную, гречневую, рисовую**
4. манную, овсяную, пшеничную

Правильный ответ: 3 — кукурузную, гречневую, рисовую

Нетоксичными злаками при целиакии являются рис, гречиха, кукуруза, пшено, амарант, киноа, монтина, чумиза, саго, сорго, тэфф. Не содержат глютена.

Клинические рекомендации. Союз педиатров России. Целиакия, 2021 (1)

4. Вариатив

Вопрос 9.

Рекомендованные приемлемые уровни глютена в хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделиях должны составлять +_____+ мг/кг готового продукта

- 1. < 20**
2. < 15
3. < 25
4. < 10

Правильный ответ: 1 — < 20

Для питания больных с целиакией рекомендуются специализированные безглютеновые продукты-заменители хлебобулочных, макаронных и кондитерских изделий. Рекомендованные приемлемые уровни глютена составляют <20 ppm* (20 мг/кг готового продукта)

Клинические рекомендации. Союз педиатров России. Целиакия, 2021 (1)

Вопрос 10.

При несоблюдении элиминационной диеты при морфологическом исследовании биоптатов слизистой оболочки тонкой кишки выявляют

1. эозинофильную инфильтрацию
2. единичные гранулемы
- 3. атрофию ворсин**
4. нейтрофильную инфильтрацию

Правильный ответ: 3 — атрофию ворсин

Комплекс морфологических изменений слизистой тонкой кишки, свойственных целиакии, включает: увеличение количества межэпителиальных лимфоцитов (МЭЛ), различную степень атрофии ворсинок и гиперплазию крипт.

Клинические рекомендации. Союз педиатров России. Целиакия, 2021 (1)

Вопрос 11.

Проведение вакцинопрофилактики у ребенка в данном клиническом случае возможно

1. только по эпидемиологическим показаниям
- 2. в период ремиссии заболевания**
3. вне зависимости от периода заболевания
4. при назначении антигистаминных препаратов

Правильный ответ: 2 — в период ремиссии заболевания

Рекомендовано проведение профилактических прививок в период ремиссии.

Клинические рекомендации. Союз педиатров России. Целиакия, 2021 (1)

Вопрос 12.

В течении первых двух лет после установки диагноза кратность проведения диспансерных осмотров составляет _____ раз/раза в год

1. 1
2. 2
3. 4
4. 3

Правильный ответ: 2 — 2

Рекомендуется следующая кратность проведения диспансерных осмотров ребенка с установленным диагнозом целиакии: после установки диагноза в течение первых двух лет – 1 раз в 6 месяцев

Клинические рекомендации. Союз педиатров России. Целиакия, 2021 (1)