



Рентгенология

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 05:44 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 05:18 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

ЧТО ВЫСТУПАЕТ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ ПЕРЕЛОМА ЛЕФОР I ПРИ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ?

1. плоскость перелома идет через носовые, слезные кости, дно глазницы, челюстно-скуловой шов
2. линия перелома проходит через носовые и слезные кости, дно глазницы по направлению к крыловидному отростку основной кости
3. линия перелома проходит через носовые и слезные кости
4. плоскость перелома проходит через альвеолярные отростки, верхнечелюстные бугры и нижние отделы крыловидных костей

Правильный ответ: 4 — плоскость перелома проходит через альвеолярные отростки, верхнечелюстные бугры и нижние отделы крыловидных костей

Вопрос 2

ОБЛАКОВИДНОЕ УПЛОТНЕНИЕ КЛЕТЧАТКИ БРЫЖЕЙКИ ТОНКОЙ КИШКИ С КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ЛИМФАДЕНОПАТИЕЙ БРЫЖЕЕЧНЫХ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ ХАРАКТЕРНО ДЛЯ

1. липосаркомы брыжейки
2. туберкулезного перитонита
3. мезентериального панникулита
4. карциноматоза

Правильный ответ: 3 — мезентериального панникулита

Вопрос 3

МЕТОДОМ ВЫБОРА В ДИАГНОСТИКЕ ПОВРЕЖДЕНИЙ И ЗАБОЛЕВАНИЙ МЯГКОТКАННЫХ СТРУКТУР ЯВЛЯЕТСЯ

1. магнитно-резонансная томография
2. позитронно-эмиссионная томография
3. сцинтиграфия
4. линейная томография

Правильный ответ: 1 — магнитно-резонансная томография

Вопрос 4



ДЛЯ УТОЧНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ КОРНЯ ЛЕГКОГО НАИБОЛЕЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ЯВЛЯЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. бронхоскопии
2. рентгенографии в боковой проекции
3. рентгеноскопии
4. компьютерной томографии

Правильный ответ: 4 — компьютерной томографии

Вопрос 5

ПАЦИЕНТУ 3 МЕСЯЦЕВ С ДИАГНОЗОМ «ВРОЖДЕННЫЙ ИНФАНТИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАЛИЗОВАННЫЙ МИОФИБРОМАТОЗ», СОСТОЯНИЕ ПОСЛЕ ПЛАСТИКИ ДИАФРАГМЫ, ВЫПОЛНЕНА КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ, РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТИНА СООТВЕТСТВУЕТ АТЕЛЕКТАЗУ _____ ЛЕГКОГО



1. средней доли левого
2. левого
3. нижней доли левого
4. верхней доли левого

Правильный ответ: 4 — верхней доли левого

Вопрос 6

ПРИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ САРКОИДОЗ ПЕЧЕНИ ПРОЯВЛЯЕТСЯ

1. гепатоспленомегалией, увеличением головки поджелудочной железы, лимфаденопатией
2. наличием образования в области ворот печени с инфильтративным ростом
3. циррозом печени, асцитом, увеличением головки поджелудочной железы
4. гепатоспленомегалией, наличием мелкоузлового поражения паренхимы, лимфаденопатией

Правильный ответ: 4 — гепатоспленомегалией, наличием мелкоузлового поражения паренхимы, лимфаденопатией

Вопрос 7

НА ПРАВИЛЬНО ПРОИЗВЕДЕННОМ АНАЛОГОВОМ РЕНТГЕНОВСКОМ СНИМКЕ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В ПРЯМОЙ ПРОЕКЦИИ ВИДНО ИЗОБРАЖЕНИЕ _____ ГРУДНЫХ ПОЗВОНКОВ

1. 4 нижних
2. 4 верхних
3. 3 нижних
4. 2 верхних

Правильный ответ: 2 — 4 верхних

Вопрос 8

ЧЕРЕДУЮЩИЕСЯ РАСШИРЕНИЯ ПРОСВЕТА ТОЛСТОЙ КИШКИ НАЗЫВАЮТ

1. ленты
2. гаустры
3. сальниковые отростки
4. жировые привески

Правильный ответ: 2 — гаустры

Вопрос 9

У ДЕТЕЙ НЕЙРОГЕННЫЕ ОПУХОЛИ НАИБОЛЕЕ ЧАСТО ЛОКАЛИЗУЮТСЯ В _____ ОТДЕЛЕ ПОЗВОНОЧНИКА

1. поясничном
2. шейном
3. грудном
4. крестцовом

Правильный ответ: 4 — крестцовом

Вопрос 10

ЗОЛОТЫМ СТАНДАРТОМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ГЕМОРРАГИИ ГОЛОВНОГО МОЗГА В ПЕРВЫЕ 24 ЧАСА ЯВЛЯЕТСЯ

1. сцинтиграфия
2. рентгеновская компьютерная томография
3. магнитно-резонансная томография
4. традиционная рентгенография

Правильный ответ: 2 — рентгеновская компьютерная томография