



Ревматология

Высшее образование

DOCX · PDF

Задач: 2

Вопросов: 24

Сформировано: 26.09.2026, 05:00 МСК · База обновлена: 26.09.2026, 04:54 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Содержание

Ситуационная задача 0001

Ситуационная задача 0002

Ситуационная задача 0001

Образование: Высшее образование | Специальность: Ревматология

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Женщина 29 лет обратилась к врачу-ревматологу.

1.2. Жалобы

На боли в мелких суставах кистей, которые в большей степени беспокоят по утрам и во вторую половину ночи, отечность в указанных суставах, утреннюю скованность в мелких суставах кистей около часа.

1.3. Анамнез заболевания

Указанные жалобы – около 2 лет, впервые возникли после родов. Грудное вскармливание окончено. Ранее обращалась к терапевту, но из-за грудного вскармливания терапия не проводилась, и было принято решение дообследование и старт терапии отложить.

1.4. Анамнез жизни

- * хронические заболевания отрицает;
- * не курит, алкоголем не злоупотребляет;
- * профессиональных вредностей не имела;
- * аллергических реакций не было;
- * отец – атеросклероз, мать – здорова.

1.5. Объективный статус

Состояние удовлетворительное. Рост 168 см, масса тела 57 кг. ИМТ 20,2. Кожные покровы обычной окраски и влажности. Периферических отеков нет. Дыхание везикулярное, ЧДД 16 в 1 мин. Тоны сердца ритмичные, ЧСС 78 в 1 мин, АД 110/70 мм рт. ст. Живот мягкий, безболезненный. Печень по краю реберной дуги.

При пальпации суставов определяется болезненность и припухлость в области проксимальных межфаланговых, пястнофаланговых, лучезапястных суставов, всего 10 болезненных суставов, 9 припухших. Симптом поперечного сжатия кистей положительный. Оценка активности заболевания по ВАШ – 60 мм.

1. План обследования

Вопрос 1.

К необходимым в данной ситуации лабораторным методам исследования для установления диагноза и определения его стадии относятся

1. клинический анализ крови
2. определение уровня антистрептолизина-О
3. определение уровня С-реактивного белка
4. определение уровня ревматоидного фактора
5. определение уровня антител к циклическому цитруллинированному полипептиду
6. определение уровня мочевой кислоты

Правильные ответы:

1 - клинический анализ крови

3 - определение уровня С-реактивного белка
4 - определение уровня ревматоидного фактора
5 - определение уровня антител к циклическому цитруллинированному полипептиду

Общий (клинический) анализ крови развернутый и исследование уровня СРБ в сыворотке крови количественным методом рекомендуется всем пациентам с целью проведения дифференциальной диагностики с невоспалительными заболеваниями суставов и оценки активности воспаления.

Клинические рекомендации Минздрава России. Ревматоидный артрит, 2024 г.

(1)

Исследование уровня С-реактивного белка проводится всем пациентам с подозрением на ревматоидный артрит. Повышение уровня С-реактивного белка является одним из классификационных критериев ревматоидного артрита ACR/EULAR 2010 года.

Клинические рекомендации Минздрава России. Ревматоидный артрит, 2024 г.

(1)

Определение содержания антител к циклическому цитруллиновому пептиду (анти-CCP) в крови (АЦЦП), определение содержания РФ в крови рекомендуется всем пациентам с целью диагностики заболевания.

Клинические рекомендации Минздрава России. Ревматоидный артрит, 2024 г.

(1)

Определение содержания антител к циклическому цитруллиновому пептиду (анти-CCP) в крови (АЦЦП), определение содержания РФ в крови рекомендуется всем пациентам с целью диагностики заболевания.

Клинические рекомендации Минздрава России. Ревматоидный артрит, 2024 г.

(1)

Вопрос 2.

К необходимым исследованиям для определения отсутствия противопоказаний к началу терапии относятся

1. магнитно-резонансная томография крестцово-подвздошных сочленений
2. исследование уровня общего холестерина и его фракций
3. рентгенография органов грудной клетки
4. исследование уровня гликемии
5. биохимический анализ крови
6. обследование на гепатиты В, С, сифилис, ВИЧ

Правильные ответы:

3 - рентгенография органов грудной клетки
5 - биохимический анализ крови
6 - обследование на гепатиты В, С, сифилис, ВИЧ

Прицельную рентгенографию органов грудной клетки рекомендуется проводить всем пациентам с ревматоидным артритом с целью выявления ревматоидного поражения органов дыхания и сопутствующих заболеваний лёгких при первичном обследовании и затем ежегодно (более частое проведение возможно при наличии клинических показаний).

Клинические рекомендации Минздрава России. Ревматоидный артрит, 2024 г.

(1)

Для выявления противопоказаний, потенциальных факторов риска развития нежелательных лекарственных реакций перед назначением противоревматической терапии всем пациентам с ревматоидным артритом рекомендуется проводить анализ крови биохимический общетерапевтический.

Клинические рекомендации Минздрава России. Ревматоидный артрит, 2024 г.

(1)

Наличие активного инфекционного процесса является противопоказанием к началу терапии ревматоидного артрита основными болезнью-модифицирующими препаратами.

Клинические рекомендации Минздрава России. Ревматоидный артрит, 2024 г.

(1)

Вопрос 3.

Количество баллов, согласно классификационным критериям ревматоидного артрита ACR/EULAR 2010 года, в данном случае равно

1. 6
2. 9
3. 8
4. 7

Правильный ответ:
3 - 8

Классификационные критерии ревматоидного артрита ACR/EULAR 2010 года являются количественными, где за каждый определенный признак дается то или иное количество баллов.

Клинические рекомендации Минздрава России. Ревматоидный артрит, 2024 г.

(1)

2. Диагноз

Вопрос 4.

По данным клинико-лабораторных проявлений заболевания, диагноз можно сформулировать как

1. Болезнь Форестье
2. Системный остеопороз
3. Системная склеродермия
4. Серопозитивный ревматоидный артрит

Правильный ответ:
4 - Серопозитивный ревматоидный артрит

Характерными признаками ревматоидного артрита являются: увеличение уровня СОЭ, С-реактивного белка, ревматоидного фактора, антител к циклическому цитруллинированному полипептиду, характерной рентгенологической картиной (околосуставной остеопороз, множественные кистовидные просветления костной ткани, сужение суставных щелей, единичные эрозии). Диагноз выставлен на основании классификационных критериев ревматоидного артрита ACR/EULAR 2010 года.

Клинические рекомендации Минздрава России. Ревматоидный артрит, 2024 г.

(1)

Вопрос 5.

Активность заболевания соответствует

- ☒ 1. высокой активности
2. низкой активности
3. умеренной активности
4. ремиссии

Правильный ответ:

1 - высокой активности

Для оценки активности заболевания используется калькулятор DAS28. DAS28 – 6,41

Клинические рекомендации Минздрава России. Ревматоидный артрит, 2024 г.

(1)

3. Лечение

Вопрос 6.

Терапию заболевания следует начинать с основного болезнь-модифицирующего препарата, которым является

1. преднизолон
2. ритуксимаб
- ☒ 3. метотрексат
4. нимесулид

Правильный ответ:

3 - метотрексат

Метотрексат рекомендуется всем пациентам с диагнозом РА, как препарат «первой линии» терапии.

Клинические рекомендации Минздрава России. Ревматоидный артрит, 2024 г.

(1)

Вопрос 7.

С учетом высокой активности заболевания возможно проведение

- ☒ 1. бридж-терапии глюкокортикостероидами
2. санаторно-курортного лечения
3. комбинированной терапии метотрексатом и лефлуномидом
4. терапии ритуксимабом

Правильный ответ:

1 - бридж-терапии глюкокортикостероидами

Рекомендуется проводить лечение глюкокортикоидами в комбинации с метотрексатом (или другими БПВП) при раннем ревматоидном артрите у пациентов с высокой активностью заболевания в течение времени, необходимого для развития эффекта БПВП (bridge-терапия).

Клинические рекомендации Минздрава России. Ревматоидный артрит, 2024 г.

(1)

Вопрос 8.

Выявленные изменения расценены как побочный эффект от приема метотрексата, называемое в виде

1. анемии
2. лейкоцитоза
3. тромбоцитопении
4. лейкопении

Правильный ответ:
3 - тромбоцитопении

Применение метотрексата может привести к развитию гематологических нарушений, к которым относится тромбоцитопения.

Клинические рекомендации Минздрава России. Ревматоидный артрит, 2024 г.

(1)

Вопрос 9.

Пациентке проведена смена терапии с метотрексата на лефлуномид. Доза препарата составляет

1. 20 мг/сутки
2. 20 мг/неделю
3. 10 мг/сутки
4. 100 мг/сутки

Правильный ответ:
1 - 20 мг/сутки

Доза лефлуномида составляет 20 мг/сутки.

Клинические рекомендации Минздрава России. Ревматоидный артрит, 2024 г.

(1)

Вопрос 10.

Таким образом, активность заболевания расценена как

1. ремиссия
2. низкая
3. высокая
4. умеренная

Правильный ответ:
1 - ремиссия

Для оценки активности заболевания используется калькулятор DAS28. DAS28 – 1,39

Клинические рекомендации Минздрава России. Ревматоидный артрит, 2024 г.

(1)

Вопрос 11.

После достижения ремиссии пациентке рекомендован осмотр ревматолога с периодичностью

1. 1 раз в год
2. 1 раз в 6 месяцев
3. 1 раз в 3 месяца
4. 1 раз в месяц

Правильный ответ:
2 - 1 раз в 6 месяцев

После достижения ремиссии пациентам с ревматоидным артритом рекомендуется осмотр раз в 6 месяцев.

Клинические рекомендации Минздрава России. Ревматоидный артрит, 2024 г.

(1)

Вопрос 12.

Через год пациентка обратилась на повторную консультацию перед планированием беременности. Активность заболевания соответствует ремиссии. Для усиления выведения лефлуномида проводят процедуру отмывания

1. мельдонием
2. холестирамином
3. цитофлавином
4. активированным углем

Правильный ответ:
2 - холестирамином

Рекомендуется отменить лефлуномид при планировании беременности. Учитывая длительную (до 2 лет) циркуляцию активных метаболитов лефлуномида, для усиления его выведения проводят процедуру отмывания холестирамином с последующим назначением альтернативного лекарственного средства, совместимого с беременностью.

Клинические рекомендации Минздрава России. Ревматоидный артрит, 2024 г.

(1)

Ситуационная задача 0002

Образование: Высшее образование | Специальность: Ревматология

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

Больной 52 лет обратился в поликлинику к врачу-ревматологу

1.2. Жалобы

- * припухание и боль в левом голеностопном суставе,
- * припухание и боль в мелких суставах правой стопы,
- * покраснение кожи над этими же суставами, ограничение движений в них,
- * боли в поясничной области

1.3. Анамнез заболевания

- * Страдает внезапными приступами болей в суставах правой стопы около 10 лет, когда впервые на фоне относительного благополучия ночью появились интенсивные боли в правом голеностопном суставе и первых плюснефаланговых суставах. Одновременно было обнаружено припухание, покраснение и повышение кожной температуры в области поражения. Самостоятельный прием анальгетиков привел к значительному уменьшению болевого синдрома и восстановлению функции суставов. В последующем было замечено, что после праздничных застолий или интенсивной физической работы, охлаждения развивается артрит голеностопного, первых плюснефаланговых суставов, а затем коленного сустава. Пациент знает о своей болезни, однако постоянной терапии не принимает.
- * Боль в области левого голеностопного сустава присоединилась в течение последних 6 месяцев. Периодически при ходьбе, особенно по неровной поверхности, в области поражённых суставов отмечается хруст.
- * Месяц назад отмечал эпизод болей в поясничной области, боли купировались самостоятельно.

1.4. Анамнез жизни


- * Рос и развивался нормально.
- * Перенесенные заболевания и операции: нет.
- * Наследственность не отягощена.
- * Вредные привычки: курит, часто употребляет алкоголь.

1.5. Объективный статус

- * Телосложение правильное, повышенного питания
- * Рост – 180 см, вес – 115 кг, ИМТ – 35 кг/м².
- * Кожные покровы чистые, достаточной влажности. Тургор тканей сохранен.
- * В области хрящевой части ушных раковин пальпируются безболезненные плотные образования величиной 0,3 x 0,2 см, белесоватые на изгибе.
- * Границы относительной тупости сердца расширены влево на 1 см. Тоны сердца чистые, ритм правильный, ЧСС 62 в минуту, АД 150/95 мм рт. ст. Дыхание везикулярное, хрипов нет. Живот увеличен в объёме за счет подкожно жировой клетчатки, при пальпации мягкий, безболезненный. Печень у края реберной дуги, безболезненная при пальпации, селезенка не пальпируется. Реагирует на поколачивание по поясничной области слева. Отеков нет.
- * Отмечаются костные деформации в области 1-го и 2-го плюснефаланговых суставов обеих стоп с формированием hallus valgus, сочетающиеся с припухлостью, покраснением кожи и повышением местной температуры над этими же суставами.
- * Симптом бокового сжатия правой стопы - положительный. Незначительное ограничение движений 1-го и 2-го пальцев правой стопы. Левый голеностопный сустав припухший, горячий и резко болезненный при пальпации, кожа гиперемирована. Объем активных и пассивных движений в нем ограничен из-за боли.



Объективный статус 1.jpg



Объективный статус 2.jpg.png

1. План обследования

Вопрос 1.

Необходимыми для постановки диагноза лабораторными исследованиями являются

1. определение суточной урикозурии и исследование общего анализа мочи с микроскопией осадка
2. определение концентрации креатинина и мочевины в сыворотке крови
- 3 определение сывороточного уровня мочевой кислоты
- 4 определение содержимого тофусов методом поляризационной микроскопии
5. клинический анализ крови и анализ мочи
6. определение уровня ионизированного кальция в сыворотке крови

Правильные ответы:

3 - определение сывороточного уровня мочевой кислоты

4 - определение содержимого тофусов методом поляризационной микроскопии

У всех пациентов с подозрением на наличие подагры рекомендуется определять сывороточный уровень мочевой кислоты.

Клинические рекомендации Ассоциации ревматологов России. Подагра, 2018 г.

(1)

Рекомендуется всем пациентам для постановки определенного диагноза подагры выявление кристаллов моноурата натрия в синовиальной жидкости или в содержимом тофуса

Клинические рекомендации Ассоциации ревматологов России. Подагра, 2018 г.

(1)

Вопрос 2.

Необходимыми для постановки диагноза инструментальными методами обследования являются

- 1 ультразвуковое исследование почек
2. МР томография левого голеностопного сустава и стопы
- 3 рентгенография дистальных отделов стоп (ДОС) и голеностопных суставов
4. магнитно-резонансная томография (МРТ) поясничного отдела позвоночника
5. обзорная рентгенография области почек и мочеточников
6. рентгенография коленных суставов

Правильные ответы:

1 - ультразвуковое исследование почек

3 - рентгенография дистальных отделов стоп (ДОС) и голеностопных суставов

УЗИ почек, если не проводилось в течение последних 6 месяцев

Клинические рекомендации Ассоциации ревматологов России. Подагра, 2018 г.

(1)

Выполнение рентгенографии вполне оправдано для проведения дифференциального диагноза с травмами, другими заболеваниями костно-мышечной системы и т.д. Формирование внутрикостных тофусов часто происходит одновременно с подкожными тофусами, поэтому рентгенологическое исследование используется и для определения тяжести тофусного поражения.

Клинические рекомендации Ассоциации ревматологов России. Подагра, 2018 г.

(1)

2. Диагноз

Вопрос 3.

Учитывая данные клинико-лабораторных и инструментальных исследований, данному больному можно поставить диагноз

1. Подострая саркоидозная артропатия
2. Хроническая тофусная подагра
3. Острый подагрический артрит
4. Глубокая флегмона стопы

Правильный ответ:

2 - Хроническая тофусная подагра

На основании классификационных критериев диагностики подагры ACR/EULAR, 2015 (ACR – American College of Rheumatology (Американский колледж ревматологии) /EULAR– European League Against Rheumatism (Европейская Антиревматическая Лига) выделяют клинические критерии:

- эпизоды типичных симптомов с вовлечением суставов;
- лабораторные критерии

- * сывороточный уровень мочевой кислоты
- * обнаружены кристаллы моноурата натрия
- методы визуализации
- * визуальные признаки депозитов уратов

Клинические рекомендации Ассоциации ревматологов России. Подагра, 2018 г.

(1)

Вопрос 4.

Внесуставным проявлением основного заболевания у больного является

1. сахарный диабет
2. уратный нефролитиаз
3. нефролитиаз
4. туннельный синдром

Правильный ответ:

2 - уратный нефролитиаз

По данным УЗИ почек осложнение подагры – нефролитиаз.

Клинические рекомендации Ассоциации ревматологов России. Подагра, 2018 г.

(1)

3. Лечение

Вопрос 5.

При остром приступе данного заболевания с учетом сопутствующей патологии пациенту показан

1. канакинумаб
2. фебуксостат
3. бензбромарон

4. аллопуринол

Правильный ответ:

1 - канакинумаб

Эффективность канакинумаба при купировании приступа артрита при подагре превышает таковую у триамцинолона ацетонида и колхицина. Учитывая большой период полувыведения и длительность эффекта, после купирования артрита целесообразно инициировать назначение уратснижающей терапии.

Клинические рекомендации Ассоциации ревматологов России. Подагра, 2018 г.

(1)

Вопрос 6.

Для длительного лечения пациенту рекомендуется проведение коррекции максимальной дозы аллопуринола в зависимости от

1. уровня протеинурии
2. сывороточного уровня мочевой кислоты
3. концентрации мочевины и креатинина
4. скорости клубочковой фильтрации

Правильный ответ:

4 - скорости клубочковой фильтрации

У пациентов с нарушением функции почек рекомендуется проведение коррекции максимальной дозы аллопуринола в зависимости от скорости клубочковой фильтрации.

Клинические рекомендации Ассоциации ревматологов России. Подагра, 2018 г.

(1)

Вопрос 7.

Индикатором эффективности лечения у данного больного является снижение концентрации мочевой кислоты до _____ мкмоль/л

1. 150
2. 360
3. 500
4. 300

Правильный ответ:

4 - 300

У пациентов с тяжелой тофусной подагрой предполагается снижение порогового значения мочевой кислоты сыворотки до более низкого (300 мкмоль/л), так как в этом случае наблюдается почти линейная обратная зависимость между сывороточным уровнем мочевой кислоты и скоростью рассасывания тофусов.

Клинические рекомендации Ассоциации ревматологов России. Подагра, 2018 г.

(1)

Вопрос 8.

При недостаточном эффекте аллопуринола, невозможности достижения целевого уровня мочевой кислоты или развитии нежелательных явлений больному необходимо назначить

1. канакинумаб

2 фебуксостат

3. парекоксиб

4. колхицин

Правильный ответ:

2 - фебуксостат

В случае развития нежелательных реакций, связанных с применением аллопуринола, а также при недостижении целевого уровня мочевой кислоты в сыворотки крови при применении максимально допустимых доз аллопуринола, рекомендуется назначение других ингибиторов ксантиноксидазы (фебуксостат).

Клинические рекомендации Ассоциации ревматологов России. Подагра, 2018 г.

(1)

4. Вариатив

Вопрос 9.

При развитии гастропатии препаратом выбора, облегчающим суставную боль, является

1. напроксен

2. кетопрофен

3. кеторолак

4 целекоксиб

Правильный ответ:

4 - целекоксиб

Наиболее безопасным в плане развития любой патологии верхних (желудок, двенадцатиперстной кишки) и нижележащих отделов желудочно-кишечного тракта (тонкая кишка) является целекоксиб.

Рекомендации по применению нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП) при ревматических заболеваниях

(1)

Вопрос 10.

При наличии показаний к уратснижающей терапии аллопуринол рекомендовано назначать

1 в исходно низкой дозе (50-100 мг ежедневно) с последующим увеличением (при необходимости) по 100 мг каждые две-четыре недели

2. только в низких дозах (50-100 мг ежедневно)

3. в исходно низкой дозе (50-100 мг ежедневно) с последующим увеличением по 100 мг через день до дозы 900 мг ежедневно

4. с максимальной суточной дозы (900 мг ежедневно) с последующим снижением по 100 мг каждые две-четыре недели

Правильный ответ:

1 - в исходно низкой дозе (50-100 мг ежедневно) с последующим увеличением (при необходимости) по 100 мг каждые две-четыре недели

Рекомендуется назначение препарата в исходно низкой дозе (50-100 мг ежедневно) с последующим увеличением (при необходимости) по 100 мг каждые две-четыре недели, что особенно важно у пациентов с почечной недостаточностью.

Клинические рекомендации Ассоциации ревматологов России. Подагра, 2018 г.

(1)

Вопрос 11.

В питании таких пациентов следует отдать предпочтение

1. богатым пуринами продуктам животного происхождения
2. морепродуктам
3. продуктам с повышенным содержанием фруктозы
4. молочным продуктам с низким содержанием жира

Правильный ответ:

4 - молочным продуктам с низким содержанием жира

Диета, обогащенная молочными продуктами с низким содержанием жира, приводит к снижению сывороточного уровня мочевой кислоты и частоты приступов артрита

Клинические рекомендации Ассоциации ревматологов России. Подагра, 2018 г.

(1)

Вопрос 12.

Для антигипертензивной терапии у данного пациента следует предпочесть назначение

1. клофелина
2. гидрохлоротиазида
3. лозартана
4. фуросемида

Правильный ответ:

3 - лозартана

Доказательства наличия у отдельных препаратов (лозартан, блокаторы кальциевых каналов, фенофибрат и, в меньшей степени, ингибиторов ГМГ-КоА-редуктазы) дополнительного уратснижающего эффекта, позволяет применять их у больных с подагрой при имеющихся показаниях к назначению, в том числе, в комбинации с ингибиторами ксантиноксидазы (аллопуринол, фебуксостат).

Клинические рекомендации Ассоциации ревматологов России. Подагра, 2018 г.

(1)