MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Стоматология ортопедическая

Высшее образование | DOCX · PDF | Задач: 1 | Вопросов: 12

Сформировано: 21.11.2026, 03:06 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1 Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2 Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3 Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4 Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт | Telegram

Ситуационная задача 0002

12 вопросов · Стоматология ортопедическая · Высшее образование

1. УСЛОВИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

1.1. Ситуация

В стоматологическую клинику обратилась пациентка А. 28 лет.

1.2. Жалобы

на

- изменение цвета,
- наличие пятен на фронтальных зубах верхней челюсти.

1.3. Анамнез заболевания

Пятна на 1.1, 2.1 зубах появились с момента прорезывания.

1.4. Анамнез жизни

- Работает.
- Росла и развивалась соответственно возрасту.
- Со слов пациентки, туберкулез, ВИЧ, Гепатит, отрицает.
- Аллергические реакции отрицает.
- Вредные привычки - курит.

1.5. Объективный статус

Внешний осмотр: конфигурация лица не изменена, регионарные лимфатические узлы не пальпируются.

Осмотр полости рта.

Зубная формула:

О	К														
1.8	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	2.1	2.2	2.3	2.4	2.5	2.6	2.7	2.8
4.8	4.7	4.6	4.5	4.4	4.3	4.2	4.1	3.1	3.2	3.3	3.4	3.5	3.6	3.7	3.8
О															О

Слизистая оболочка рта бледно-розового цвета, умеренно увлажнена.

Прикус: ортогнатический.

Локальный статус:

на 1.1, 2.1 зубах имеются множественные меловидные пятна. Отмечаются борозды на вестибулярной части зуба.

1. План обследования

Вопрос 1

Для выбора тактики лечения данной пациентки необходимо использовать дополнительные методы обследования

1. **электроодонтометрию**
2. электромиографию
3. **внутриротовую контактную рентгенографию**
4. телерентгенографию
5. аксиографию

Правильные ответы:
1 - электроодонтометрию
3 - внутриротовую контактную рентгенографию

ОБОСНОВАНИЕ

Проводят при наличии патологической стираемости, клиновидных дефектах, расширении периодонтальной щели, вторичной деформации зубных рядов и т. д., перед началом препарирования зубов под коронки для определения необходимости депульпирования. При работе с зубами с витальной пульпой электроодонтодиагностику необходимо проводить до начала лечения, не ранее чем через три дня после препарирования и перед фиксацией несъемной конструкции на постоянный цемент для определения необходимости депульпирования при развитии воспалительного процесса в результате препарирования

Клинические рекомендации (протоколы лечения) «Частичное отсутствие зубов (частичная вторичная адентия, потеря зубов вследствие несчастного случая, удаления или локализованного пародонтита)»
Утверждены Постановлением № 15 Совета Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России» от 30 сентября 2014 года

КЛИНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (ПРОТОКОЛЫ ЛЕЧЕНИЯ) ПРИ ДИАГНОЗЕ ЧАСТИЧНОЕ ОТСУТСТВИЕ ЗУБОВ (ЧАСТИЧНАЯ ВТОРИЧНАЯ АДЕНТИЯ, ПОТЕРЯ ЗУБОВ ВСЛЕДСТВИЕ НЕСЧАСТНО ГО СЛУЧАЯ, УДАЛЕНИЯ ИЛИ ЛОКАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА) Утверждены Постановлением № 15 Совета Ассоциации общественных объединений «Стоматологическая Ассоциация России» от 30 сентября 2014 года (1)

Для помощи в постановке диагноза. Помогает выявить воспалительный процесс, протекающий в области верхушек корней зубов.

Ортопедическая стоматология / под ред. И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 824 с. - ISBN 978-5-9704-3582-3 (1)

3. Результаты дополнительных методов обследования

3.1. Внутриротовая контактная рентгенография

Корневые каналы 1.1 и 2.1 зубов не запломбированы, периапикальных изменений нет.

3.2. Электроодонтометрия

Значения электровозбудимости составили 4 мкА

3.4. Телерентгенография

Асимметрии лица нет. Зубные ряды в ортогнатическом прикусе.

3.5. Аксиография

Диск находится в суставной ямке, головка н/ч без изменений.

2. Диагноз

Вопрос 2

Основным диагнозом в данной клинической ситуации является

1. Наследственные нарушения структуры зуба, не классифицированные в других рубриках
2. **Нарушения формирования зубов**
3. Крапчатые зубы
4. Кариес эмали

Правильный ответ:
2 - Нарушения формирования зубов

ОБОСНОВАНИЕ

Гипоплазия (hypoplasia) - порок развития, заключающийся в недоразвитии зуба или его тканей

Терапевтическая стоматология : национальное руководство / под ред. Л. А. Дмитриевой, Ю. М. Максимовского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2021 ISBN 978-5-9704-6097-9 (1)

5. Диагноз

K00.4 Нарушения формирования зубов

3. Лечение

Вопрос 3

Наиболее оптимальным вариантом ортопедического лечения 1.1, 2.1 зубов в данной клинической ситуации является изготовление

1. бюгельного протеза
2. **керамических виниров**
3. керамической вкладки
4. культевой штифтовой вкладки

Правильный ответ:
2 - керамических виниров

ОБОСНОВАНИЕ

Виниры устанавливаются только на фронтальные зубы с целью восстановления эстетики зубного ряда.

Ортопедическая стоматология / под ред. И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 824 с. - ISBN 978-5-9704-3582-3 (1)

Вопрос 4

К показанию для применения виниров у данной пациентки относят

1. **эстетические дефекты зубов**
2. генерализованный пародонтит
3. частичную вторичную адентию
4. полный дефект коронковой части зуба

Правильный ответ:
1 - эстетические дефекты зубов

ОБОСНОВАНИЕ

Показаниями к применению виниров являются эстетические дефекты зубов три наличии достаточной площади сохранившейся эмали.

Ортопедическая стоматология : национальное руководство : в 2 т. / под ред. И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнова, А.Н. Ряховского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - Т. 2. - 416 с. : ил. - (Серия "Национальные руководства"). - DOI: 10.33029/9704-6367-3-OD2-2022-1-416. - ISBN 978-5-9704-6367-3. (1)

Вопрос 5

При изготовлении виниров в данной клинической ситуации препарирование тканей зуба проводится в пределах

1. дентина
2. **эмали**
3. цемента
4. пульпы

Правильный ответ:
2 - эмали

ОБОСНОВАНИЕ

При изготовлении виниров препарирование тканей зуба проводится только в пределах эмали.

Ортопедическая стоматология / под ред. И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 824 с. - ISBN 978-5-9704-3582-3 (1)

Вопрос 6

При препарировании зуба для изготовления винира сошлифовывают _____ мм твёрдых тканей зуба

1. 0,8-0,9
2. **0,3-1,0**
3. 0,9-1,0
4. 0,1-0,2

Правильный ответ:
2 - 0,3-1,0

ОБОСНОВАНИЕ

При препарировании следует обращать особое внимание на глубину: сошлифовывают 0,3-1,0 мм твёрдых тканей зуба.

Ортопедическая стоматология. Том 1 : национальное руководство : в 2 т. / под ред. И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнова, А.Н. Ряховского. - 2-е изд. , перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - 520 с. (Серия "Национальные руководства") - ISBN 978-5-9704-6366-6 (1)

Вопрос 7

Для изготовления виниров пациентка может выбрать керамику или

1. базисную пластмассу
2. моделировочный воск
3. беззольную пластмассу
4. **композитные материалы**

Правильный ответ:
4 - композитные материалы

ОБОСНОВАНИЕ

Виниры изготавливаются из стоматологической керамики или композитных материалов.

Ортопедическая стоматология / под ред. И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 824 с. - ISBN 978-5-9704-3582-3 (1)

Вопрос 8

Для снятия оттиска при изготовлении виниров в данной клинической ситуации будут использовать _____ оттискные массы

1. **силиконовые двухслойные**
2. термопластические
3. цинкоксидэвгенольные
4. тиоколовые

Правильный ответ:
1 - силиконовые двухслойные

ОБОСНОВАНИЕ

При изготовлении виниров используют силиконовые двухслойные оттискные массы.

Ортопедическая стоматология : национальное руководство : в 2 т. / под ред. И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнова, А.Н. Ряховского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - Т. 2. - 416 с. : ил. - (Серия "Национальные руководства"). - DOI: 10.33029/9704-6367-3-OD2-2022-1-416. - ISBN 978-5-9704-6367-3. (1)

Вопрос 9

При изготовлении керамических виниров оттиск

1. двухэтапный однослойный
2. функциональный однослойный
3. одноэтапный однослойный
4. **одноэтапный двуслойный**

Правильный ответ:
4 - одноэтапный двуслойный

ОБОСНОВАНИЕ

Одноэтапный метод можно эффективно использовать при наддесневом расположении границ препарирования. Широкое распространение этот метод получил при микропротезировании.

Ортопедическая стоматология : национальное руководство : в 2 т. / под ред. И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнова, А.Н. Ряховского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - Т. 2. - 416 с. : ил. - (Серия "Национальные руководства"). - DOI: 10.33029/9704-6367-3-OD2-2022-1-416. - ISBN 978-5-9704-6367-3. (1)

Вопрос 10

Для фиксации виниров в данной клинической ситуации используют

1. цинкполикарбоксилатный цемент химического отверждения
2. цинкфосфатный цемент химического отверждения
3. **композитный материал двойного отверждения**
4. стеклоиономерный цемент химического отверждения

Правильный ответ:
3 - композитный материал двойного отверждения

ОБОСНОВАНИЕ

Проводится фиксация винира на композитный материал для цементирования двойного отверждения.

Ортопедическая стоматология / под ред. И. Ю. Лебеденко, С. Д. Арутюнова, А. Н. Ряховского - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2016. - 824 с. - ISBN 978-5-9704-3582-3 (1)

4. Вариатив

Вопрос 11

Для цементировки виниров у пациентки используют фиксацию

1. винтовую
2. **адгезивную**
3. самоадгезивную
4. традиционную

Правильный ответ:
2 - адгезивную

ОБОСНОВАНИЕ

Для фиксации виниров необходимо использовать исключительно адгезивную фиксацию, поскольку препарирование в этом случае не является ретенционным.

Ортопедическая стоматология : национальное руководство : в 2 т. / под ред. И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнова, А.Н. Ряховского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - Т. 2. - 416 с. : ил. - (Серия "Национальные руководства"). - DOI: 10.33029/9704-6367-3-OD2-2022-1-416. - ISBN 978-5-9704-6367-3. (1)

Вопрос 12

Анализ окклюзионно-мышечной нагрузки в данной клинической ситуации после фиксации виниров проводят с помощью синхронизированных аппаратов

1. Reference SL и MIO-STIM
2. T-scan и MIO-STIM
3. BioPak-ЭМГ и Reference SL
4. **T-scan и BioPak-ЭМГ**

Правильный ответ:
4 - T-scan и BioPak-ЭМГ

ОБОСНОВАНИЕ

После фиксации несъёмных конструкций на постоянный цемент приступают к анализу окклюзионно-мышечной нагрузки с помощью синхронизированных аппаратов T-scan и BioPak-ЭМГ.

Ортопедическая стоматология : национальное руководство : в 2 т. / под ред. И.Ю. Лебеденко, С.Д. Арутюнова, А.Н. Ряховского. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2022. - Т. 2. - 416 с. : ил. - (Серия "Национальные руководства"). - DOI: 10.33029/9704-6367-3-OD2-2022-1-416. - ISBN 978-5-9704-6367-3. (1)