



Стоматология (ПП)

Высшее образование

DOCX · PDF · XLSX

Вопросов: 10

Сформировано: 25.07.2026, 08:50 МСК · База обновлена: 25.07.2026, 08:29 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов — ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

[Официальный сайт fmza.ru](https://fmza.ru) >

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

[Открыть репетиционный экзамен](#) >

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- medikcase.ru
- Telegram: [@medikcase](https://t.me/medikcase)
- support@medikcase.ru



Сайт



Telegram

Вопрос 1

К РЕЦЕССИИ ДЕСНЫ II КЛАССА ПО КЛАССИФИКАЦИИ МИЛЛЕРА ОТНОСИТСЯ РЕЦЕССИЯ

1. десны в пределах подвижной слизистой оболочки переходной складки, межзубная десна или костная ткань межальвеолярных перегородок частично утрачены с образованием множественных зияющих межзубных промежутков
2. десны в пределах подвижной слизистой, потеря десны и/или кости в межзубных промежутках отсутствует
3. десны в пределах подвижной слизистой оболочки переходной складки, межзубная десна и костная ткань межальвеолярной перегородки частично утрачены в области двух зубов
4. в пределах прикрепленной десны, потеря десны и/или кости в межзубных промежутках отсутствует

Правильный ответ: 2 — десны в пределах подвижной слизистой, потеря десны и/или кости в межзубных промежутках отсутствует

Вопрос 2

ДЕТЯМ В ВОЗРАСТЕ ДО 3 ЛЕТ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ ЧИСТКИ ЗУБОВ ЗУБНУЮ ЩЁТКУ

1. жёсткую
2. мягкую
3. средней жёсткости
4. очень мягкую

Правильный ответ: 4 — очень мягкую

Вопрос 3

ДЛЯ ЗАКРЫТИЯ ГЛУБОКИХ ДЕФФЕКТОВ НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИМ ДОНОРСКИМ МЕСТОМ ДЛЯ СВОБОДНОЙ ПЕРЕСАДКИ КОЖИ НА ЛИЦО ЯВЛЯЕТСЯ

1. задняя поверхность шеи
2. лопаточная область
3. кожа голени
4. передняя поверхность живота

Правильный ответ: 2 — лопаточная область

Вопрос 4

НАРУШЕНИЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ КОЖИ ПОДГЛАЗНИЧНОЙ ОБЛАСТИ, БОКОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ НОСА, ВЕРХНЕЙ ГУБЫ ЯВЛЯЕТСЯ СЛЕДСТВИЕМ ТРАВМАТИЧЕСКОГО ПОВРЕЖДЕНИЯ

1. подглазничного нерва
2. лицевого нерва
3. мягких тканей
4. третьей ветви тройничного нерва

Правильный ответ: 1 — подглазничного нерва

Вопрос 5

КОНТРАКТУРА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮСТИ БЫВАЕТ

1. герпетическая
2. воспалительная
3. множественная
4. линейная

Правильный ответ: 2 — воспалительная

Вопрос 6

СЛИЗИСТО-НАДКОСТНИЧНЫЙ ЛОСКУТ ПРИ ЦИСТЭКТОМИИ ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ ТЕМ, ЧТО ОН

1. соответствует очагу деструкции кости
2. больше очага деструкции кости
3. соответствует верхушке причинного зуба
4. меньше очага деструкции кости

Правильный ответ: 2 — больше очага деструкции кости

Вопрос 7

РАНУЛОЙ НАЗЫВАЕТСЯ КИСТА СЛЮННОЙ ЖЕЛЕЗЫ

1. подъязычной
2. малой
3. поднижнечелюстной
4. околоушной

Правильный ответ: 1 — подъязычной

Вопрос 8

ЛЕЧЕНИЕ ОЧАГОВОЙ ДЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ЭМАЛИ ПРОВОДЯТ ПРЕПАРАТАМИ, СОДЕРЖАЩИМИ

1. только кальций
2. кальций и фтор
3. только фтор
4. литий

Правильный ответ: 2 — кальций и фтор

Вопрос 9

ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ КРОВОТОЧИВОСТИ ДЁСЕН ПАЦИЕНТАМ СЛЕДУЕТ РЕКОМЕНДОВАТЬ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗУБНУЮ ПАСТУ, СОДЕРЖАЩУЮ

1. карбонат кальция
2. фторид натрия
3. экстракты лекарственных растений
4. хлорид стронция

Правильный ответ: 3 — экстракты лекарственных растений

Вопрос 10

ИНДЕКС ТОННА ИСПОЛЬЗУЮТ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ

- 1. пропорциональности верхних и нижних резцов
- 2. длины зубного ряда
- 3. пропорциональности размеров верхнего и нижнего зубных рядов
- 4. ширины зубного ряда

Правильный ответ: 1 — пропорциональности верхних и нижних резцов