MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Стоматология

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 02:56 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1

Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2

Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3

Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4

Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

ДЕСТРУКЦИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ ТВЁРДОГО НЁБА МОЖЕТ НАБЛЮДАТЬСЯ ПРИ

1. **рабдомиосаркоме**
2. полиморфной аденоме
3. папилломе
4. аденолимфоме

Правильный ответ: 1 - рабдомиосаркоме

Вопрос 2

АППАРАТ PENDULUM ПРИМЕНЯЮТ ДЛЯ

1. смещения нижней челюсти вперёд
2. смещения верхнего зубного ряда вперёд
3. **дистализации моляров верхней челюсти**
4. стабилизации положения верхней челюсти

Правильный ответ: 3 - дистализации моляров верхней челюсти

Вопрос 3

ДЛЯ РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ РАДИКУЛЯРНОЙ КИСТЫ ХАРАКТЕРНЫ ИЗМЕНЕНИЯ КОСТНОЙ ТКАНИ

1. в виде "тающего сахара"
2. **с чёткими контурами в области верхушек одного или нескольких зубов**
3. в виде нескольких полостей с чёткими контурами
4. с нечёткими границами в области одного или нескольких зубов

Правильный ответ: 2 - с чёткими контурами в области верхушек одного или нескольких зубов

Вопрос 4

ИЗМЕНЕНИЯ КОЖИ ПОДОШВ И ЛАДОНЕЙ В СОЧЕТАНИИ С ТЯЖЁЛЫМ ПОРАЖЕНИЕМ ПАРОДОНТА ИМЕЮТСЯ ПРИ

1. болезни Иценко - Кушинга
2. **синдроме Папийона - Лефевра**
3. гипофизарном нанизме
4. циклической нейтропении

Правильный ответ: 2 - синдроме Папийона - Лефевра

Вопрос 5

ВОСПАЛЕНИЕ МЯГКИХ ТКАНЕЙ, ОКРУЖАЮЩИХ КОРОНКУ ПРОРЕЗЫВАЮЩЕГОСЯ ЗУБА, НАЗЫВАЕТСЯ

1. **перикоронит**
2. периостит
3. остеомиелит
4. периодонтит

Правильный ответ: 1 - перикоронит

Вопрос 6

ПОСЛЕ ЭНДОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ПОСТОЯННОГО ЗУБА С НЕЗАКОНЧЕННЫМ ФОРМИРОВАНИЕМ КОРНЯ УСПЕШНЫЙ ИСХОД АПЕКСОГЕНЕЗА ОЦЕНИВАЮТ МЕТОДОМ

1. ЭОД
2. **рентгенографии**
3. реопародонтографии
4. РМА

Правильный ответ: 2 - рентгенографии

Вопрос 7

К ВИДАМ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ОТНОСИТСЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ

1. экстренная, неотложная, плановая
2. **первичная медико-санитарная, скорая, специализированная, паллиативная**
3. по врачебным специальностям
4. амбулаторная, стационарная, стационарная дневная, вне медицинской организации

Правильный ответ: 2 - первичная медико-санитарная, скорая, специализированная, паллиативная

Вопрос 8

ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ СИНДРОМА БОЛЕВОЙ ДИСФУНКЦИИ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА ПРОВОДЯТ

1. **сплинт-терапию**
2. восстановление суставной ямки
3. эндопротезирование сустава
4. экзартикуляцию

Правильный ответ: 1 - сплинт-терапию

Вопрос 9

В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ ОТДЕЛЕНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ СТОМАТОЛОГИИ ДОЛЖНО ВКЛЮЧАТЬ ПОМЕЩЕНИЙ НЕ МЕНЕЕ

1. **5**
2. 2
3. 4
4. 3

Правильный ответ: 1 - 5

Вопрос 10

ИНТЕНСИВНОСТЬ КАРИЕСА ЗУБОВ ВЫРАЖАЕТСЯ

1. отношением суммы кариозных и запломбированных зубов к возрасту пациента
2. суммой запломбированных и удалённых зубов у одного индивидуума
3. суммой кариозных и запломбированных зубов у одного индивидуума
4. **суммой кариозных, запломбированных и удалённых зубов у одного индивидуума**

Правильный ответ: 4 - суммой кариозных, запломбированных и удалённых зубов у одного индивидуума