MedikCase

Система самостоятельной подготовки к аккредитации

ТОЛЬКО ДЛЯ ЛИЧНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Торакальная хирургия

Высшее образование | DOCX · PDF · XLSX | Вопросов: 10

Сформировано: 21.11.2026, 04:05 МСК

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПЕРЕД НАЧАЛОМ

1 Материалы предназначены для одного покупателя

Используйте файлы только для личной подготовки. Не передавайте их третьим лицам, не публикуйте, не размещайте в открытом доступе и не перепродавайте полностью или частично.

2 Источник материалов - ФМЗА

Вопросы и ситуационные задачи получены только из опубликованных материалов Методического центра аккредитации специалистов.

Официальный сайт fmza.ru ›

3 Ответы можно проверить самостоятельно

Используйте комплект при прохождении репетиционного экзамена и убедитесь, что выбранные ответы совпадают с результатом официальной системы.

Открыть репетиционный экзамен ›

4 Состав материалов может обновляться

ФМЗА может изменять формулировки, порядок и состав заданий. Перед подготовкой используйте актуальную версию комплекта и сверяйтесь с официальным источником.

Важно: MedikCase систематизирует материалы ФМЗА для самостоятельной подготовки, не изменяя смысл вопросов и ответов. Актуальность комплекта можно проверить в официальном репетиционном экзамене.

Сайт, обновления и поддержка

- **medikcase.ru**
- Telegram: @medikcase
- **support@medikcase.ru**

Сайт

Telegram

Вопрос 1

К ХАРАКТЕРНЫМ ПРИЗНАКАМ ДЛЯ БОЛЕЙ В ГРУДНОЙ КЛЕТКЕ, СВЯЗАННЫХ С ПОРАЖЕНИЕМ ПЛЕВРЫ, ОТНОСЯТ

1. **усиление болей при глубоком дыхании и кашле**
2. иррадиацию в левое плечо
3. сжимающий характер болей
4. усиление болей при положении на больном боку

Правильный ответ: 1 - усиление болей при глубоком дыхании и кашле

Вопрос 2

ПРИ РАКЕ ЛЕГКОГО НАИБОЛЕЕ ЧАСТО МЕТАСТАЗАМИ ПОРАЖАЮТСЯ ГРУППЫ ЛИМФАТИЧЕСКИХ УЗЛОВ

1. подмышечные
2. забрюшинные
3. **внутригрудные**
4. шейные

Правильный ответ: 3 - внутригрудные

Вопрос 3

В ТЕЧЕНИИ ТРАВМАТИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ ПРИ ЗАКРЫТОЙ ТРАВМЕ ГРУДИ ВЫДЕЛЯЮТ

1. 5 периодов
2. **4 периода**
3. 2 периода
4. 3 периода

Правильный ответ: 2 - 4 периода

Вопрос 4

ПРАВЫЙ ВЕРХНЕДОЛЕВОЙ БРОНХ ДЕЛИТСЯ НА СЕГМЕНТАРНЫЕ БРОНХИ _____ СЕГМЕНТОВ

1. 1-5
2. 4-5
3. **1-2-3**
4. 6-10

Правильный ответ: 3 - 1-2-3

Вопрос 5

С ЦЕЛЬЮ БОЛЕЕ ДЛИТЕЛЬНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ МНОЖЕСТВЕННЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОКОНЧАТЫХ ПЕРЕЛОМАХ РЕБЕР НАИБОЛЕЕ ОПРАВДАНО И ЭФФЕКТИВНО ПРИМЕНЕНИЕ

1. пролонгированной атаралгезии
2. **блокады «трех мест», перидуральной анестезии с катетером**
3. нейролептаналгезии
4. наркотических и ненаркотических анальгетиков

Правильный ответ: 2 - блокады «трех мест», перидуральной анестезии с катетером

Вопрос 6

ПРИ НЕЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ ФИБРИНОЗНО-ЯЗВЕННОГО РЕФЛЮКС-ЭЗОФАГИТА ПОКАЗАНО ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ В ОБЪЕМЕ

1. эндоскопической аргоноплазменной коагуляции слизистой пищевода
2. пластики пищевода
3. проксимальной резекции желудка
4. **фундопликации**

Правильный ответ: 4 - фундопликации

Вопрос 7

НА ОБЗОРНОЙ РЕНТГЕНОГРАММЕ ОРГАНОВ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ В НОРМЕ В КОРНЕ ЛЕГКОГО НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ

1. разветвления легочной артерии
2. просветы промежуточных бронхов
3. **лимфатические узлы**
4. крупные вены

Правильный ответ: 3 - лимфатические узлы

Вопрос 8

К НАИБОЛЕЕ ИНФОРМАТИВНЫМ МЕТОДАМ ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОСТРОМ ГНОЙНОМ МЕДИАСТИНИТЕ ОТНОСЯТ

1. пневмоперитонеум
2. ультрасонографию
3. лабораторные
4. **рентгенологические**

Правильный ответ: 4 - рентгенологические

Вопрос 9

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ПОСЛЕОПЕРАЦИОННАЯ ЛЕТАЛЬНОСТЬ ПРИ ГАНГРЕНЕ ЛЁГКОГО В СРЕДНЕМ СОСТАВЛЯЕТ (В %)

1. **28-35**
2. 9-13
3. 16-22
4. 40-50

Правильный ответ: 1 - 28-35

Вопрос 10

ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ВЕН ПОРТАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ С ЦЕЛЬЮ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУТЕЙ ПОРТАЛЬНОГО ШУНТИРОВАНИЯ И ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ ВАРИКОЗНЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА И ЖЕЛУДКА ПОКАЗАНА

1. спленопортография
2. чрескожная чреспеночная портография
3. **дигитальная субтракционная артериопортография**
4. магнитно-резонансная томография с контрастным усилением

Правильный ответ: 3 - дигитальная субтракционная артериопортография